Variaties in medische praktijken

# Kleine gyneco-verloskundige heelkunde

Analyse van de verdeling van de medische praktijk in volumes en in uitgaven per patiënt en per verzekerde in België (verdeling, herhaling, trends per gewest, provincie en arrondissement) voor het jaar **2025**

RIZIV – Dienst voor Geneeskundige Verzorging – Directie Onderzoek, Ontwikkeling en Kwaliteitspromotie

**Cel Doelmatige Zorg**

Pascal Meeus, Benjamin Swine, Katrien Declercq, Delphine Beauport

Contact : appropriatecare@riziv-inami.fgov.be

**Datum van dit rapport : 2 september 2026**

# INHOUDSTAFEL

**INHOUDSTAFEL** ..... **2**

**1. INLEIDING** ..... **3**

**2. SAMENVATTING VAN DE BELANGRIJKSTE GEGEVENS** ..... **4**

**3. SPECIFIEKE ANALYSEMETHODE** ..... **5**

A. NOMENCLATUURCODENUMMERS VAN HET RIZIV DIE IN DE ANALYSE ZIJN OPGENOMEN ..... 5
B. HISTORIEK VAN DE NOMENCLATUURCODENUMMERS ..... 6
C. EVOLUTIE VAN DE VERDELING IN VOLUMES VAN DE GEPRESTEERDE NOMENCLATUURCODENUMMERS ..... 7
D. GEGEVENSBRON EN ANALYSEPERIODE ..... 8
E. SELECTIECRITERIA ..... 9
F. SPECIALISME VAN DE ZORGVERLENERS ..... 10
G. SPECIALISME VAN DE VOORSCHRIJVERS ..... 11
H. (GESCHAT) AANTAL PATIËNTEN PER JAAR ..... 12
I. STANDAARDISATIE ..... 13

**4. RESULTATEN** ..... **14**

A. NATIONAAL GESTANDAARDISEERD GEBRUIK ..... 14
B. GESTANDAARDISEERD GEBRUIK PER GESLACHT EN PER LEEFTIJD ..... 15
C. FREQUENTIE VAN AMBULANTE VERSTREKKINGEN ..... 17
D. GESTANDAARDISEERD GEBRUIK VOLGENS DE TERUGBETALINGSREGELING ..... 19
E. EVOLUTIE VAN HET GESTANDAARDISEERD GEBRUIK ..... 21
F. GEOGRAFISCHE VARIATIES VAN HET GESTANDAARDISEERD GEBRUIK ..... 25
G. GESTANDAARDISEERDE UITGAVEN VOOR GENEESKUNDIGE VERZORGING TEN LASTE VAN DE VERZEKERING ..... 29

**5. BIJLAGEN** ..... **35**

A. VARIANTIEANALYSE (ANOVA), BEHALVE BRUSSEL ..... 35
B. FREQUENTIE VAN HERHALINGEN VAN DE PRAKTIJK (PER PATIËNT) ..... 36
C. TYPES VAN TENLASTENEMING VAN DE PATIËNT ..... 40
D. CODERINGSVARIATIES EN PRAKTIJKALTERNATIEVEN ..... 43

# 1. INLEIDING

De Cel Doelmatige Zorg binnen de Directie Onderzoek-Ontwikkeling-Kwaliteitspromotie van de Dienst voor Geneeskundige Verzorging van het RIZIV werd opgericht als gevolg van de Bestuursovereenkomst 2016-2018 van het RIZIV[1]. In artikel 35 wordt in "de oprichting van een Cel doelmatige zorg met specifieke focus op een geïntegreerde aanpak voor een rationeel gebruik van de middelen" voorzien. Het project met het oog op de oprichting van de Cel Doelmatige Zorg is in het tweede trimester 2017 gelanceerd.

De concrete oprichting van de cel is geformaliseerd in het "Actieplan handhaving in de gezondheidszorg 2016-2017" dat het RIZIV op 18 juli 2016 heeft gepubliceerd[1]. In dat plan worden een dertigtal maatregelen opgesomd om de gezondheidszorg efficiënter te maken door een adequate praktijkvoering te bevorderen en nutteloze of ongeschikte zorg te bestrijden.

Hierin is overeengekomen dat een van de opdrachten van de Cel Doelmatige Zorg bestaat in een analyse van de "relevantie van de zorg" waarbij het de bedoeling is om onverklaarbare variaties in de consumptie na standaardisatie op te sporen. Die variaties kunnen namelijk wijzen op een mogelijke niet-optimale benutting van de middelen.

De rapporten "Variaties in medische praktijken" bevatten de analyses die in dat kader zijn uitgevoerd. In elk rapport komt een welbepaald thema aan bod.

In dit document worden de becijferde resultaten en de grafieken van de praktijkanalyses[2] Kleine gyneco-verloskundige heelkunde weergegeven en de belangrijkste leessleutels aangereikt.

We hebben aan dit document bewust geen interpretatie toegevoegd, aangezien we deze vaststellingen eerst wilden voorleggen aan de professionele zorgverleners die het best in staat zijn om ze te interpreteren. Dit document is echter vrij toegankelijk om de reflectie over het thema objectief en openlijk te voeden.

De in deze analyse gepresenteerde gegevens weerspiegelen de dekking van de kosten van zorgprestaties door de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging. Dit betekent echter niet dat alle prestaties worden verleend in overeenstemming met de regelgeving en/of richtlijnen

[1] (Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, 2016)

[2] Er wordt verwezen naar het document "Praktijkvariaties - Methode" waar de geïnteresseerde lezer meer uitleg kan vinden over de methode die voor deze kwantitatieve analyses is gebruikt.

## 2. SAMENVATTING VAN DE BELANGRIJKSTE GEGEVENS

| | | TOTAL | Δ[1] |
|---|---|---|---|
| **ZORGVERLENERS & VOORSCHRIJVERS** | | | |
| **Voornaamste zorgverleners:** | *Gynaecologie en verloskunde* | **98,51%** | |
| **Voornaamste voorschrijvers:** | *Niet gedefinieerd* | **-** | |
| **GEBRUIK** | | | |
| **Aantal prestaties per jaar** | | **153.608** | |
| **Gemiddelde herhaling per patiënt per dag** (prestaties) | | **1,09** | |
| **Gemiddelde herhaling per patiënt per jaar** (dagen) | | **1,20** | |
| **Totale gemiddelde herhaling** | | **1,31** | |
| **Geschat aantal patiënten** (per jaar) | | **116.164** | |
| **Gestandaardiseerd gebruik** (per 100 000 verzekerden) | | **1.957** | |
| **Percentage ambulante verstrekkingen** | | **95,14%** | |
| **Percentage dagziekenhuis/(dagziekenhuis + klassiek ziekenhuis)** | | **88,48%** | |
| **POPULATIE** | | | |
| **% van de geselecteerde populatie t.o.v. het totale aantal verzekerden** | | **50,79%** | |
| **Mediane leeftijd van patiënten** | | **39** jaar | |
| **Ratio gestand. gebruik vrouwen/mannen** (patiënten) | | **NA** | |
| **Ratio gestand. gebruik voorkeurregeling/algemene regeling** (patiënten) | | **0,93** | |
| **TRENDS** | | | |
| **Trends[2]** (2015-2025) | | **-1,74% *** | |
| **Trends** (2015-2023) | | **-0,73%** | |
| **Trends[3]** (2023-2025) | | **-5,69% NS** | |
| **DIRECTE UITGAVEN** | | | |
| **Jaarlijkse uitgaven** | | **9.191.289** € | |
| **Gemiddelde jaarlijkse uitgaven per verzekerde[4]** | | **1,55** € | |
| **Gemiddelde jaarlijkse uitgaven per patiënt** | | **79,12** € | **δδδ** |

[1] **Δ Verspreidingsmarker: vergelijking van de variatiecoëfficiënt (CV) van de indicator met de mediaan (MED) van de CV's van alle analyses voor deze indicator: δ als CV > MED + 10%, δδ als CV > MED + 20%, δδδ als CV > MED + 30%.**
**Uitzondering: voor de mediane leeftijd betekent δ CV > MED + 30%.**

[2] De test geeft aan of het groeipercentage statistisch verschilt van 0%.

[3] De test geeft aan of de trendbreuk tussen de twee periodes statistisch significant is.

[4] Uitgaven zijn gebaseerd op de geselecteerde verzekerden

# 3. SPECIFIEKE ANALYSEMETHODE

## A. Nomenclatuurcodenummers van het RIZIV die in de analyse zijn opgenomen

De nomenclatuurcodenummers van het RIZIV die in de analyse zijn opgenomen, worden hieronder opgesomd:

| Ambulant | Gehospitaliseerd | Aantal | Uitgaven | Omschrijving | Creatiedatum | Schrappingsdatum | GroepN | Waarde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220290 | 220301 | ja | ja | ° Baarmoedercurettage, curatieve of exploratieve, eventueel inclusief dilatatie en afname voor endo-uterine biopsie | 01/04/1985 | | N20 | K50 |
| 424115 | 424126 | ja | ja | ° Verloskundige ingreep wegens miskraam van vier tot zes maanden | 01/04/1985 | | N10 | K75 |
| 431056 | x | ja | ja | Exeresis van de klier van Bartholin | 01/04/1985 | | N11 | K75 |
| 431093 | 431104 | ja | ja | Marsupialisatie van de klier van Bartholin | 01/04/1985 | | N11 | K75 |
| 431130 | 431141 | ja | ja | Culdoscopie | 01/04/1985 | | N11 | K30 |
| 431152 | 431163 | ja | ja | Cystoscopie, met of zonder afname voor biopsie bij de vrouw | 01/04/1985 | | N11 | K35 |
| 431410 | 431421 | ja | ja | Kymografische insufflatie der eileiders en/of inspuiting van contrastmiddel voor hysterosalpingografie en/of intratubaire inspuiting van therapeutisch produkt | 01/04/1985 | | N11 | K25 |
| 431513 | 431524 | ja | ja | Ringen van baarmoederhals | 01/04/1985 | | N11 | K75 |
| 431535 | 431546 | ja | ja | Dilatatie van baarmoederhals, onder narcose, afzonderlijke ingreep | 01/04/1985 | | N11 | K30 |
| 431675 | 431686 | ja | ja | Vulvotomie ter vergroting met tenotomie der hefspieren, buiten verloskundig maneuver, exclusief episiotomie | 01/04/1985 | | N11 | K75 |
| 431756 | 431760 | ja | ja | Vagina- en vulvaplastiek | 01/04/1985 | | N11 | K75 |
| 431771 | 431782 | ja | ja | Heelkundige bewerking wegens vaginacyste | 01/04/1985 | | N11 | K75 |
| 431933 | 431944 | ja | ja | Heelkundige bewerking wegens hematocolpos | 01/04/1985 | | N11 | K30 |
| 431955 | 431966 | ja | ja | ** Microscopische colposcopie | 01/04/1985 | | N11 | K30 |
| 432191 | 432202 | ja | ja | Resectie van kleine schaamlip | 01/04/1985 | | N11 | K45 |
| 432213 | 432224 | ja | ja | Resectie van de twee kleine schaamlippen | 01/04/1985 | | N11 | K75 |
| 432294 | 432305 | ja | ja | Conisatie van de baarmoederhals met anatomopathologische bevestiging | 01/04/1985 | | N11 | K40 |
| 432353 | 432364 | ja | ja | Invasieve obstetrische procedure (amniocentese, foetale punctie, cordocentese) onder echografische controle | 01/04/1985 | | N11 | K40 |
| 432390 | 432401 | ja | ja | Diagnostische hysteroscopie met of zonder biopsie of cytologie, met protocol | 01/04/1985 | | N11 | K25 |
| 432412 | 432423 | ja | ja | Therapeutische hysteroscopie voor exeresis van een poliep of voor myomectomie of voor resectie van intra-uteriene synechieën of voor catheterisatie van de tubaire opening | 01/04/1985 | | N11 | K50 |
| 432493 | 432504 | ja | ja | Diagnostische laparoscopie zonder biopsie, inclusief het pneumoperitoneum | 01/11/1998 | | N11 | K70 |
| 432832 | 432843 | ja | ja | Inspuiting van echogeen contrastmiddel voor hysterosalpingo-(foam)sonografie ter beoordeling van de uteriene caviteit en de doorgankelijkheid van de eileiders | 01/01/2023 | | N11 | N57 |


Deze tabel bevat de nomenclatuurcodenummers van het RIZIV die in de analyse zijn opgenomen met de vermelding van hun eventuele opname in de analyses van de verstrekkingen en de uitgaven, en hun beschrijving, hun creatie- en schrappingsdatum, hun eventuele N-groep (van de RIZIV-nomenclatuur) en hun waarde.

## B. Historiek van de nomenclatuurcodenummers

| Ambulant | Gehospitaliseerd | Datum | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| **424115** | **424126** | 01/04/1985 | ° Verloskundige ingreep wegens miskraam van vier tot zes maanden, op voorwaarde dat de vrouw het bewijs heeft geleverd dat op haar zwangerschap geneeskundig toezicht is uitgeoefend in de derde maand |
| | | 01/02/2016 | ° Verloskundige ingreep wegens miskraam van vier tot zes maanden |
| **432294** | **432305** | 01/08/1988 | Conisatie van de baarmoederhals |
| | | 01/12/2018 | Conisatie van de baarmoederhals met anatomopathologische bevestiging |

In deze tabel wordt de historiek weergegeven van de beschrijvingen van de nomenclatuurcodenummers van het RIZIV die in de analyse zijn opgenomen, in het geval van wijzigingen aangebracht tijdens de periode 2015-2025.

## C. Evolutie van de verdeling in volumes van de gepresteerde nomenclatuurcodenummers




| Gecombineerde codes | Omschrijving |
|---|---|
| **Other** | Andere codes |
| **432832-432843** | Inspuiting van echogeen contrastmiddel voor hysterosalpingo-(foam)sonografie ter beoordeling van de uteriene caviteit en de ... |
| **432412-432423** | Therapeutische hysteroscopie voor exeresis van een poliep of voor myomectomie of voor resectie van intra-uteriene synechieën of ... |
| **432390-432401** | Diagnostische hysteroscopie met of zonder biopsie of cytologie, met protocol |
| **432294-432305** | Conisatie van de baarmoederhals met anatomopathologische bevestiging |
| **431955-431966** | ** Microscopische colposcopie |
| **431410-431421** | Kymografische insufflatie der eileiders en/of inspuiting van contrastmiddel voor hysterosalpingografie en/of intratubaire ... |
| **220290-220301** | ° Baarmoedercurettage, curatieve of exploratieve, eventueel inclusief dilatatie en afname voor endo-uterine biopsie |

Deze grafiek is beperkt tot de belangrijkste nomenclatuurcodes in termen van volume. Alle nomenclatuurcodes die voor de analyse zijn gebruikt, worden beschreven op pagina 5.

Note : Het jaar 2020 werd aangegeven door een verticale stippellijn, om de aandacht te vestigen op de impact van de COVID-19 crisis.

## D. Gegevensbron en analyseperiode

De gegevens die in de analyses zijn opgenomen, zijn afkomstig van deze databanken:

| | |
|---|---|
| **Document N** | Voor aantallen en uitgaven van verzekerden die in België gedomicilieerd zijn, in 2015-2025 |
| **Document P** | Voor aantallen en uitgaven per specialisme van zorgverleners, in 2025<br>Voor de evolutie van het aantal dagopnames, in 2015-2025 |
| **Document P, AZV, ADH** | Voor herhalingscijfers per patiënt en verdeling per type zorg (ambulant privé of polikliniek, daghospitalisatie, hospitalisatie), in 2024 |

| | |
|---|---|
| **Analyseperiode** | 2015-2025 |

Document N: De N-documenten zijn maandelijkse gegevens die binnen een termijn van drie maanden door de verzekeringsinstellingen aan het RIZIV worden bezorgd. Die gegevens omvatten het aantal verstrekkingen, de data en de honoraria en worden om de zes maanden verzameld en aangevuld met de patiëntengegevens van de verzekeringsinstellingen: leeftijd, geslacht, sociale categorie en arrondissement van de woonplaats. De N-documenten kunnen echter niet worden gebruikt om combinaties van verstrekkingen per verzekerde te analyseren

Document P: De P-documenten zijn semestriële gegevens die binnen een termijn van vier maanden door de verzekeringsinstellingen aan het RIZIV worden bezorgd. Die gegevens omvatten de verrichte verstrekkingen, de zorgverleners, de voorschrijvers, de plaatsen van verstrekking en de plaatsen van ziekenhuisopname. De P-documenten kunnen worden gebruikt om de medische consumptie en de tarifering te volgen, maar niet om de verstrekkingen per patiënt te groeperen.

Documenten AZV, ADH : zijn jaarlijkse gegevens die binnen een termijn van zes maanden door de verzekeringsinstellingen aan het RIZIV worden bezorgd. Ze omvatten alle verstrekkingen die respectievelijk tijdens een daghospitalisatie en tijdens een klassieke hospitalisatie in de algemene ziekenhuizen worden verricht, per verblijf. .

Herhaling: de herhalingscijfers zijn gebaseerd op het meest recente jaar waarin consolidatie per patiënt tussen P- en SHA-ADH-documenten mogelijk is, meestal het jaar voorafgaand aan het laatste jaar van de analyseperiode.

## E. Selectiecriteria

Eventueel werden sommige filters op de gegevens toegepast om slechts een deel van de populatie in de analyses te selecteren. De toegepaste filters worden in de onderstaande tabel weergegeven indien van toepassing:

| OP DE GEGEVENS TOEGEPASTE FILTERS | |
|---|---|
| **Geslacht** | Vrouwen |
| **Leeftijd** | Alle |
| **-** | - |

In deze analyse hebben de indicatoren altijd betrekking op deze populatie.

## F. Specialisme van de zorgverleners

| Specialisatie verstrekker | Aantal verstrekkers codes | Aantal verstrekkers | % verstrekkers codes | Mediaan aantal verstrekkingen | Q3 aantal verstrekkingen | % Verstrekkingen | % Uitgaven |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gynaecologie en verloskunde | 1.676 | 1.427 | 85,1% | 57 | 131 | 98,5% | 98,3% |
| Urologie | 484 | 50 | 10,3% | 1 | 4 | 0,8% | 0,8% |
| Andere | 26.001 | 172 | 0,7% | | | 0,7% | 0,9% |
| Totaal | 28.161 | 1.649 | 5,9% | - | - | 100,0% | 100,0% |

In deze tabel worden respectievelijk de volgende niet-gestandaardiseerde gegevens per medisch specialisme weergegeven (cijfers voor het jaar 2025):

- Aantal zorgverleners per specialisme die minstens één verstrekking hebben geattesteerd
- Aantal zorgverleners die nomenclatuurcodenummers hebben geattesteerd die in deze analyse zijn opgenomen
- Percentage zorgverleners die deze codenummers hebben geattesteerd ten opzichte van het aantal zorgverleners die minstens één verstrekking hebben geattesteerd
- Het mediane aantal en derde kwartiel van de verstrekkingen per zorgverlener (die codenummers attesteren)
- Het percentage van de prestaties (voor de codes die in volume zijn opgenomen)
- Het percentage van de uitgaven (voor de codes die zijn opgenomen in de uitgaven)

## G. Specialisme van de voorschrijvers

[Specialisme van voorschrijvers is onbekend of niet van toepassing]

## H. (Geschat) aantal patiënten per jaar

Soms worden meerdere codes (gelijkaardig of verschillend) die betrekking hebben op dezelfde praktijk meerdere keren op dezelfde dag en/of in hetzelfde jaar gefactureerd voor dezelfde patiënt.

Om het aantal behandelde patiënten te schatten, wordt het totale aantal geregistreerde prestaties per jaar gedeeld door een gemiddelde delingsfactor (totale gemiddelde herhaling).

In deze analyse is de gemiddelde delingsfactor 1,31. Dit laatste wordt berekend op basis van 2024 en is het resultaat van het delen van het totale aantal prestaties door het totale aantal verschillende verzekerden die van deze prestaties gebruik hebben gemaakt (per leeftijdsgroep, geslacht en district).

Deze gemiddelde delingsfactor wordt de totale gemiddelde herhaling genoemd. Deze totale gemiddelde herhaling is het product van de gemiddelde herhaling per patiënt per dag (**gemiddeld aantal prestaties per dag per patiënt**) en de gemiddelde herhaling per patiënt per jaar (**gemiddeld aantal dagen per jaar per patiënt**). Uitleg over deze gemiddelde herhalingen per dag en per jaar is te vinden in de bijlage “Frequentie van herhalingen van de praktijk (per patiënt)”.

De volumes worden echter niet gedeeld voor de gegevens over zorgverleners en voorschrijvers (zie sectie 3.F en G), noch voor de grafieken en tabellen die de verdeling van volumes en herhalingen van de praktijk weergeven (zie 4.C en bijlagen B tot en met D).

## I. Standaardisatie

Gegevens weergegeven per geografische deelgroep* of bevolkingscategorie worden gestandaardiseerd per jaar op basis van de leeftijd (per jaar), het geslacht en de voorkeursregeling van de nationale bevolking in 2025.

*Opmerking: Arrondissementen met minder dan 100 000 verzekerden zijn samengevoegd met een aangrenzend arrondissement uit dezelfde provincie. De volgende arrondissementen worden daarom samen beschouwd: Oostende/Veurne, Ieper/Diksmuide, Roeselare/Tielt, Gent/Eeklo, Charleroi/Thuin, Huy/Waremme, Namur/Philippeville, Neufchâteau/Marche-en-Famenne, Virton/Bastogne/Arlon. Deze groepen en namen zijn van toepassing op alle metingen, kaarten en grafieken die per arrondissement worden geproduceerd. In het hele document wordt het concept van gegroepeerd arrondissement weerspiegeld in het gebruik van de term "arrondissement*"

**Standaardisatie** is een proces waarmee populaties voor een of meer analysecriteria vergelijkbaar worden gemaakt. Als er een verschil tussen die populaties wordt waargenomen, zal hieruit dus kunnen worden afgeleid dat dit verschil niet te wijten is aan de criteria die bij de standaardisatie in aanmerking zijn genomen.


# 4. RESULTATEN

## A. Nationaal gestandaardiseerd gebruik

| | TOTAAL |
|---|---|
| *Aantal prestaties per jaar* | *153.608* |
| Gemiddelde herhaling per patiënt per dag (gemiddeld aantal prestaties per dag) | 1,09 |
| Gemiddelde herhaling per patiënt per jaar (gemiddeld aantal dagen per jaar) | 1,20 |
| Totale gemiddelde herhaling (deelt het aantal prestaties) | 1,31 |
| *Geschat aantal patiënten per jaar* | *116.164* |
| Gestandaardiseerd gebruik per 100 000 verzekerden | 1.957 |

## B. Gestandaardiseerd gebruik per geslacht en per leeftijd

| | TOTAL |
|---|---|
| *Geschat aantal patiënten per jaar* | *116.164* |
| Mediane leeftijd (jaar) | 39 |
| Gemiddelde leeftijd (jaar) | 42,47 |
| Gestandaardiseerd gebruik: vrouwen (per 100 000) | 1.957 |
| Gestandaardiseerd gebruik: mannen (per 100 000) | NA |
| Ratio vrouwen/mannen | NA |
| Percentage vrouwen | 100,00% |




**Gestandaardiseerd gebruik per 100 000 verzekerden en variatiecoëfficiënt volgens de arrondissementen* per leeftijdscategorie en per geslacht voor het jaar 2025**


Deze grafiek bestaat uit staafdiagrammen voor elk geslacht.

De **variatiecoëfficiënt**, weergegeven met de rode lijn, is een relatieve spreidingsmaat voor het vastgestelde gestandaardiseerd gebruik per arrondissement*, leeftijdscategorie en geslacht (de standaardafwijking gedeeld door het gemiddelde). Deze lijn wordt in het vet weergegeven voor de leeftijdscategorieën waarin de variatiecoefficiënt geldig kan worden geïnterpreteerd (d.w.z. voor de leeftijdscategorieën met voldoende verzekerden per arrondissement* om te kunnen vergelijken).

De linkse verticale as van de grafiek stemt overeen met het gestandaardiseerd gebruik en de rechtse met de variatiecoëfficiënt. De horizontale as toont de uitsplitsing per leeftijdscategorie. De horizontale stippellijnen geven de totale waarden van het gestandaardiseerd gebruik (in het blauw) en de variatiecoëfficiënt (in het rood) weer.

## C. Frequentie van ambulante verstrekkingen


| | TOTAAL |
|---|---|
| *Aantal prestaties per jaar* | *153.608* |
| Percentage ambulante verstrekkingen | 95,14% |




**Percentage ambulante verstrekkingen in totaal en per gewest**

De grafiek geeft het percentage ambulant verrichte verstrekkingen weer (met inbegrip van de daghospitalisaties), d.w.z. het aantal ambulante verstrekkingen ten opzichte van het totale aantal verstrekkingen (ambulant en ziekenhuisverblijven).

Naast een balkje per gewest, wordt er een balkje voor de Belgische populatie getoond. Die totale verhouding wordt ook met een stippellijn weergegeven.





**Evolutie van het percentage ambulante verstrekkingen per provincie**

Het jaar 2020 werd aangegeven door een verticale stippellijn, om de aandacht te vestigen op de impact van de COVID-19 crisis.

Een aanvulling op dit hoofdstuk met de details van de tenlasteneming van de patienten per type gaat als bijlage bij dit rapport (zie bijlage C).

## D. Gestandaardiseerd gebruik volgens de terugbetalingsregeling

| | TOTAAL |
|---|---|
| *Geschat aantal patiënten per jaar* | *116.164* |
| Percentage voorkeurregeling | 19,40% |
| Gestandaardiseerd gebruik met voorkeurregeling (per 100 000) | 1.849 |
| Gestandaardiseerd gebruik zonder voorkeurregeling (per 100 000) | 1.982 |
| Ratio Voorkeurregeling/Algemene regeling | 0,93 |





**Gestandaardiseerd gebruik volgens de terugbetalingsregeling en de gewesten**

De grafiek geeft het gestandaardiseerd gebruik van patiënten per 100 000 verzekerden weer met (in het rood) en zonder (in het grijs) voorkeurregeling, per gewest en in totaal.

De rode en grijze stippellijnen geven het totaal gestandaardiseerd gebruik van patiënten per 100 000 verzekerden weer, respectievelijk met en zonder voorkeurregeling.

## E. Evolutie van het gestandaardiseerd gebruik

| | TOTAAL | Statistische significantie |
|---|---|---|
| *Geschat aantal patiënten per jaar* | *116.164* | |
| **Trend (2015-2025)** | **-1,74%** | *** (-1.11%)** |
| Trend (2015-2023) | -0,73% | NS |
| Trend (2023-2025) | -5,69% | |





**Evolutie per gewest van het gestandaardiseerd gebruik per 100 000 verzekerden**

De hier berekende trends stemmen overeen met het gemiddeld jaarlijks groeipercentage.

Een niet-significante statistische test wijst erop dat de trend geschat door het model (tussen haakjes) stabiel is, of dat er geen trendbreuk is.

Deze grafiek toont een gekleurde curve per gewest en een zwarte curve voor de volledige Belgische bevolking. Op de horizontale as worden de jaren weergegeven en op de verticale as het gestandaardiseerd gebruik per 100 000 verzekerden.

N.B.: Het jaar 2020 werd aangegeven door een verticale stippellijn, om de aandacht te vestigen op de impact van de COVID-19 crisis.




**Evolutie per arrondissement* van het gestandaardiseerd gebruik per 100 000 verzekerden**

Deze grafiek toont een gekleurde curve per arrondissement* en een zwarte curve voor de volledige Belgische bevolking. Op de horizontale as worden de jaren weergegeven en op de verticale as het gestandaardiseerd gebruik per 100 000 verzekerden.

Om de evolutieve trends beter te kunnen weergeven, zijn de geïllustreerde cijfers een **voortschrijdend gemiddelde** van de cijfers in de periode van 3 jaar die voorafgaat aan het in aanmerking genomen jaar (het betreffende jaar inbegrepen).

In deze grafiek worden slechts de 5 arrondissementen* met de hoogste gemiddelden en de 5 arrondissementen* met de laagste gemiddelden over de laatste 3 onderzochte jaren weergegeven (met uitzondering van de arrondissementen van Henegouwen die sterk getroffen werden door de administratieve reorganisatie van 2019).

N.B.: Het jaar 2020 werd aangegeven door een verticale stippellijn, om de aandacht te vestigen op de impact van de COVID-19 crisis.

| | | Gebruik | Jaarlijkse groei | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ***2025*** *(per $10^5$ verzekerden)* | **2015-2025** | **2015-2023** | **2023-2025** | **Trendbreuk** |
| **Provincies** | West-Vlaanderen | *1.708* | 0,18% | -0,14% | 1,49% | NS |
| | Oost-Vlaanderen | *1.859* | 0,02% | -1,53% | 6,46% | NS |
| | Antwerpen | *1.866* | 1,37% | 0,16% | 6,35% | NS |
| | Limburg | *1.866* | -2,46% | -4,79% | 7,48% | NS |
| | Vlaams-Brabant | *1.880* | -1,17% | -0,13% | -5,24% | NS |
| | Brussel | *2.316* | -2,45% | 0,23% | -12,48% | * |
| | Waals-Brabant | *2.264* | -1,68% | 3,75% | -20,68% | *** |
| | Henegouwen | *2.176* | -5,04% | -0,52% | -21,15% | *** |
| | Luik | *1.890* | -2,44% | -2,02% | -4,12% | NS |
| | Namen | *2.316* | -2,90% | -1,43% | -8,57% | NS |
| | Luxemburg | *1.579* | -3,45% | -0,60% | -14,05% | * |
| **Gewesten** | Vlaanderen | *1.839* | -0,20% | -1,06% | 3,35% | * |
| | Brussel | *2.316* | -2,45% | 0,23% | -12,48% | * |
| | Wallonië | *2.083* | -3,59% | -0,50% | -15,02% | * |
| | **TOTAAL** | ***1.957*** | **-1,74%** | **-0,73%** | **-5,69%** | **NS** |


**Evolutie van het gebruik per provincie en per gewest**

Deze tabel vermeldt naast het gestandaardiseerd gebruik voor het laatste onderzochte jaar (2025) ook de gemiddelde **groeipercentages** per provincie, per gewest en in totaal, zowel voor de volledige periode (2015-2025), als voor de laatste jaren (2023-2025) en voor de periode die voorafgaat aan de laatste jaren (2015-2023).

Om na te gaan of de trend van de laatste jaren verschilt van de trend in de jaren die voorafgaan, wordt een lineair mixed model gefit in twee fasen. In de eerste fase wordt getest of de trend in de laatste jaren verschilt van de trend in de jaren die voorafgaan op nationaal niveau. Vervolgens wordt, als de test significant is, getest of de verandering van trend significant is op het niveau van elke provincie, elk gewest en nationaal. De gegevens van 2020 werden van de analyses uitgesloten.

De significantie van de trendbreuk wordt gerapporteerd in de trendbreukkolom: * P-waarde ≤ 0,05 / ** P-waarde ≤ 0,01 / *** P-waarde ≤ 0,001 en NS voor een niet-significante trendbreuk.

De waarden "NA" worden vermeld wanneer de nomenclatuurcodenummers die in de analyse zijn opgenomen, niet werden toegepast in de volledige periode van de laatste in aanmerking genomen jaren, of wanneer de statistische testen niet kunnen worden uitgevoerd.





**Trendbreuk beoordelingsmodel per provincie - Regressielijnen**

Regressielijnen per provincie met mogelijks een verschillende helling voor de laatste jaren (2023-2025) in vergelijking met die voor de jaren die aan deze periode vooraf gaan (2015-2023).

De gegevens van 2020 werden uitgesloten van de analyses maar zijn ter informatie aangegeven op de grafiek.

## F. Geografische variaties van het gestandaardiseerd gebruik

| | TOTAAL |
|---|---|
| *Geschat aantal patiënten per jaar* | *116.164* |
| Variatiecoëfficiënt (2025) | 14,89 |
| Variatiecoëfficiënt (2023-2025) | 28,11 |
| Variatiecoëfficiënt (2015-2017) | 33,28 |
| *Statistisch significant verschil? (p ≤ 0.05)* | *Nee* |





**"Dotplot-verdeling" van het gestandaardiseerd gebruik per arrondissement* per geslacht**

Een **dotplot**-grafiek is een spreidingsdiagram dat nuttig is om de aandacht te vestigen op groeperingen van gegevens, gaten in de verdeling of op extreme waarden. In dit geval geeft elk punt het gebruik van een arrondissement* weer voor de volledige populatie of per geslacht.

De cijfers worden afgerond volgens de waarde van het maximum (tot op de eenheid, een tiende, een honderdste, ...) voor een betere groepering van de waarden.

De grafiek toont ook een box met het 25ste, 50ste en 75ste percentiel van de niet-afgeronde cijfers voor alle arrondissementen*. De lijn onderaan de box stemt overeen met het 25ste percentiel terwijl het 75ste percentiel wordt weergegeven door de bovenste lijn. De lijn in de box stemt overeen met het 50ste percentiel.




**Kaart met de verdeling per arrondissement* van het gestandaardiseerd gebruik**

Op deze kaart van België worden de arrondissementsgrenzen met fijne lijnen en de provinciegrenzen met dikke lijnen aangegeven.


De arrondissementen* zijn ingekleurd aan de hand van een kleurenschaal die gebaseerd is op de verhouding tussen het gebruik in dat arrondissement* en het nationale Belgische (totale) gebruik. Die verhouding wordt uitgedrukt in percentages: bijvoorbeeld 0% als de ratio van het arrondissement* gelijk is aan de nationale ratio, 20 % als het percentage 20 % hoger ligt en -20 % als het percentage 20 % lager ligt.

De percentages worden berekend op basis van het gestandaardiseerd gebruik van het laatste onderzochte jaar en worden in schijven van 20 % verdeeld. De volgende kleuren worden gebruikt:

| Kleur | Categorie |
|---|---|
| | Meer dan 50% |
| | Tussen 30% en 50% |
| | Tussen 10% en 30% |
| | Tussen -10% en 10% |
| | Tussen -30% en -10% |
| | Tussen -50% en -30% |
| | Minder dan -50% |
| | Geen gebruik |

N.B.: De interpretatie van deze kaart moet parallel gebeuren met die van de grafiek in funnelplot (volgende pagina).

* Arrondissementen aangeduid met ^ of * zijn gegroepeerd binnen dezelfde provincie.
zie pagina 13, Standaardisatie




**"Funnelplot" van het gestandaardiseerd gebruik per arrondissement* volgens het aantal verzekerden**

In deze grafiek wordt het gestandaardiseerd gebruik in een arrondissement* gepositioneerd ten opzichte van het bevolkingsaantal. Naast de punten per arrondissement* worden ook de 95% en 99.7% betrouwbaarheidsintervallen op de grafiek weergegeven. Deze hangen af van het bevolkingsaantal.

De dikke horizontale lijn geeft het nationaal gestandaardiseerd gebruik weer. De extreme arrondissementen* worden geïdentificeerd door de punten die buiten de 99.7% betrouwbaarheidsintervallen vallen. De zone tussen beide betrouwbaarheidsintervallen wordt als "warning zone" beschouwd.

N.B.: De interpretatie van deze grafiek moet parallel gebeuren met die van de verdelingskaart van het gebruik (vorige pagina).

## G. Gestandaardiseerde uitgaven voor geneeskundige verzorging ten laste van de verzekering

| | TOTAAL |
|---|---|
| *Aantal prestaties per jaar* | *153.608* |
| *Jaarlijkse uitgaven (€)* | *9.191.289* |
| Gemiddelde kostprijs per patiënt (€) | 79,12 |
| Gemiddelde kostprijs per verzekerde[1] (€) | 1,55 |

[1] Opmerking: Uitgaven zijn gebaseerd op de verzekerden die zijn geselecteerd voor de analyse (zie sectie 3.E, Selectiecriteria).

| | | Gestandaardiseerde uitgaven (per verzekerde[1]) | Relatief verschil ten opzichte van totaal |
|---|---|---|---|
| Provincies | West-Vlaanderen | 1,5 € | -3,23% |
| | Oost-Vlaanderen | 1,5 € | -3,23% |
| | Antwerpen | 1,6 € | 3,23% |
| | Limburg | 1,46 € | -5,81% |
| | Vlaams-Brabant | 1,53 € | -1,29% |
| | Brussel | 1,69 € | 9,03% |
| | Waals-Brabant | 1,52 € | -1,94% |
| | Henegouwen | 1,66 € | 7,10% |
| | Luik | 1,46 € | -5,81% |
| | Namen | 1,65 € | 6,45% |
| | Luxemburg | 1,18 € | -23,87% |
| Gewesten | Vlaanderen | 1,53 € | -1,29% |
| | Brussel | 1,69 € | 9,03% |
| | Wallonië | 1,55 € | 0,00% |
| | **TOTAAL** | **1,55 €** | |


**Verdeling per gewest en provincie van de gestandaardiseerde uitgaven (2025)**

[1] Opmerking: Uitgaven zijn gebaseerd op de verzekerden die zijn geselecteerd voor de analyse (zie sectie 3.E, Selectiecriteria).

## Evolutie van de uitgaven per verstrekking en per nomenclatuurcodenummer

| Nomenclatuurcodes | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | % Gemiddelde jaarlijks groei | % Prestaties 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 431955-431966 | 13,46 | 13,46 | 13,56 | 13,75 | 13,77 | 13,92 | 14,05 | 14,29 | 15,08 | 15,98 | 45,73 | 13,01% | 38,3% |
| 432390-432401 | 33,63 | 33,63 | 33,85 | 34,35 | 34,40 | 34,72 | 35,11 | 35,71 | 37,71 | 39,92 | 41,36 | 2,09% | 16,9% |
| 220290-220301 | 62,37 | 62,32 | 62,92 | 62,78 | 62,47 | 63,40 | 63,83 | 65,27 | 68,89 | 72,66 | 75,65 | 1,95% | 9,9% |
| 432412-432423 | 67,11 | 66,97 | 67,54 | 68,57 | 68,65 | 69,19 | 69,79 | 71,09 | 75,32 | 79,77 | 82,70 | 2,11% | 6,6% |
| 432294-432305 | 57,33 | 56,98 | 57,78 | 57,74 | 57,43 | 58,09 | 58,42 | 59,30 | 62,99 | 66,17 | 69,00 | 1,87% | 6,5% |
| 431410-431421 | 33,64 | 33,63 | 33,89 | 34,35 | 34,39 | 34,70 | 35,08 | 35,69 | 37,61 | 39,89 | 41,35 | 2,08% | 6,2% |
| 432832-432843 | | | | | | | | | 86,51 | 90,40 | 94,17 | 4,33% | 5,9% |
| 432353-432364 | 60,57 | 60,58 | 61,00 | 61,90 | 62,00 | 62,64 | 63,21 | 64,24 | 67,86 | 71,90 | 74,44 | 2,08% | 2,2% |
| 431756-431760 | 107,87 | 108,17 | 108,93 | 110,74 | 110,80 | 111,42 | 113,47 | 114,03 | 120,96 | 128,58 | 132,27 | 2,06% | 2,1% |
| 431152-431163 | 47,13 | 47,09 | 47,43 | 48,14 | 48,21 | 48,71 | 49,18 | 50,04 | 52,91 | 56,00 | 56,39 | 1,81% | 1,1% |
| 431535-431546 | 45,22 | 45,31 | 45,62 | 46,29 | 46,42 | 46,90 | 47,33 | 48,05 | 50,74 | 53,57 | 55,73 | 2,11% | 1,0% |
| 432493-432504 | 97,90 | 97,38 | 97,99 | 99,44 | 99,73 | 98,98 | 100,87 | 102,91 | 111,50 | 118,93 | 122,70 | 2,28% | 0,9% |
| 424115-424126 | 105,18 | 105,22 | 105,94 | 107,42 | 107,64 | 108,73 | 109,73 | 111,52 | 117,61 | 124,45 | 129,20 | 2,08% | 0,9% |
| 431093-431104 | 110,73 | 111,24 | 111,26 | 113,44 | 114,65 | 116,00 | 117,34 | 118,69 | 123,52 | 132,57 | 136,97 | 2,15% | 0,5% |
| 431513-431524 | 112,51 | 112,65 | 112,85 | 115,39 | 115,23 | 116,32 | 115,84 | 119,87 | 125,75 | 133,75 | 138,67 | 2,11% | 0,3% |
| 431771-431782 | 109,79 | 110,02 | 109,38 | 111,28 | 110,67 | 112,38 | 113,15 | 115,38 | 122,94 | 128,73 | 131,94 | 1,85% | 0,3% |
| 432213-432224 | 108,64 | 108,43 | 109,29 | 107,64 | 109,54 | 110,33 | 110,62 | 115,28 | 120,20 | 125,79 | 132,85 | 2,03% | 0,2% |
| 431056- | 111,15 | 112,93 | 113,48 | 115,34 | 115,40 | 115,90 | 117,65 | 119,73 | 124,59 | 132,13 | 138,75 | 2,24% | 0,2% |
| 432191-432202 | 64,13 | 65,02 | 65,88 | 64,75 | 63,85 | 67,13 | 68,05 | 67,88 | 71,55 | 73,28 | 77,98 | 1,97% | 0,1% |
| 431933-431944 | 43,43 | 44,20 | 43,35 | 44,44 | 44,10 | 41,62 | 45,17 | 46,55 | 47,56 | 48,96 | 52,30 | 1,88% | 0,0% |
| 431130-431141 | 40,30 | 39,13 | 40,68 | 41,25 | 41,34 | 41,77 | 42,09 | 42,60 | 45,30 | 47,34 | 49,58 | 2,09% | 0,0% |

De gemiddelde uitgaven per nomenclatuurcode en per jaar worden vermeld voor de codes die in volume zijn geselecteerd (zie sectie 3.A) en waarvoor in 2025 prestaties zijn gefactureerd. Ze zijn gerangschikt in afnemende volgorde van frequentie, op basis van het percentage geleverd in 2025 (laatste kolom).
Wanneer het aantal betrokken nomenclatuurcodes groot is, wordt de lijst beperkt tot die codes die 1 % van het totale volume bereiken.




**Kaart met de verdeling per arrondissement* van de gestandaardiseerde uitgaven (per verzekerde)**

Op deze kaart van België worden de arrondissementsgrenzen met fijne lijnen en de provinciegrenzen met dikke lijnen aangegeven.

De arrondissementen* zijn ingekleurd aan de hand van een kleurenschaal die is gebaseerd op de verhouding tussen de uitgaven per verzekerde in dat arrondissement* en de nationale Belgische (totale) uitgaven per verzekerde. Die verhouding wordt in percentages uitgedrukt : bijvoorbeeld 0 % als de uitgaven van het arrondissement* gelijk zijn aan de totale uitgaven, 20 % als de uitgaven 20 % hoger liggen en -20 % als de uitgaven 20 % lager liggen.

De percentages worden berekend op basis van de gestandaardiseerde uitgaven van het laatste onderzochte jaar en worden per schijven van 20 % verdeeld. De volgende kleuren worden gebruikt:

| Kleur | Categorie |
|---|---|
| | Meer dan 50% |
| | Tussen 30% en 50% |
| | Tussen 10% en 30% |
| | Tussen -10% en 10% |
| | Tussen -30% en -10% |
| | Tussen -50% en -30% |
| | Minder dan -50% |
| | Geen uitgave |

* Arrondissementen aangeduid met ^ of * zijn gegroepeerd binnen dezelfde provincie.
zie pagina 13, Standaardisatie




Op deze kaart zijn de arrondissementen* ingekleurd aan de hand van een kleurenschaal die is gebaseerd op de verhouding tussen de uitgaven per patiënt en de nationale Belgische (totale) uitgaven per patiënt.

Die verhouding wordt in percentages uitgedrukt:

| Kleur | Categorie |
|---|---|
| | Meer dan 50% |
| | Tussen 30% en 50% |
| | Tussen 10% en 30% |
| | Tussen -10% en 10% |
| | Tussen -30% en -10% |
| | Tussen -50% en -30% |
| | Minder dan -50% |
| | Geen uitgave |

**Kaart met de verdeling per arrondissement* van de gestandaardiseerde uitgaven (per patiënt)**

* Arrondissementen aangeduid met ^ of * zijn gegroepeerd binnen dezelfde provincie.
zie pagina 13, Standaardisatie

**Gestandaardiseerde uitgaven per patiënt in 2025 en herhalingen van de praktijk per patiënt in 2024 (zie Bijlage B), per demografische categorie**

| | Geschatte gestd. uitgaven per patiënt | | Herhaling per jaar | Herhaling per jaar | Herhaling per dag |
|---|---|---|---|---|---|
| | (€) | Tot. relatief verschil(%) | (Prestaties) | (Dagen) | (Prestaties) |
| TOTAAL | 79,12 | | 1,31 | 1,20 | 1,09 |
| **Geslacht** | | | | | |
| Mannen | | | | | |
| Vrouwen | 79,12 | 0,00% | 1,31 | 1,20 | 1,09 |
| **Voorkeurregeling** | | | | | |
| Algemeen | 78,77 | -0,44% | 1,31 | 1,20 | 1,09 |
| Voorkeur | 80,37 | 1,58% | 1,33 | 1,21 | 1,10 |
| **Gewest** | | | | | |
| Vlaanderen | 82,98 | 4,88% | 1,34 | 1,21 | 1,11 |
| Brussel | 72,82 | -7,97% | 1,32 | 1,23 | 1,07 |
| Wallonië | 74,47 | -5,87% | 1,29 | 1,18 | 1,09 |
| **Leeftijd** | | | | | |
| 00-04 | 111,94 | 41,47% | 1,13 | 1,07 | 1,06 |
| 05-09 | 135,05 | 70,68% | 1,05 | 1,02 | 1,02 |
| 10-14 | 142,02 | 79,49% | 1,19 | 1,04 | 1,15 |
| 15-19 | 98,65 | 24,68% | 1,22 | 1,09 | 1,12 |
| 20-24 | 85,99 | 8,67% | 1,25 | 1,14 | 1,09 |
| 25-29 | 81,94 | 3,56% | 1,30 | 1,20 | 1,08 |
| 30-34 | 84,51 | 6,81% | 1,33 | 1,22 | 1,09 |
| 35-39 | 84,12 | 6,31% | 1,36 | 1,25 | 1,09 |
| 40-44 | 78,11 | -1,28% | 1,35 | 1,24 | 1,09 |
| 45-49 | 72,21 | -8,73% | 1,31 | 1,20 | 1,09 |
| 50-54 | 71,67 | -9,42% | 1,31 | 1,18 | 1,11 |
| 55-59 | 73,05 | -7,68% | 1,31 | 1,17 | 1,12 |
| 60-64 | 73,01 | -7,73% | 1,29 | 1,16 | 1,11 |
| 65-69 | 72,51 | -8,36% | 1,27 | 1,15 | 1,10 |
| 70-74 | 74,14 | -6,30% | 1,27 | 1,14 | 1,11 |
| 75-79 | 73,13 | -7,58% | 1,23 | 1,12 | 1,10 |
| 80-84 | 74,84 | -5,41% | 1,25 | 1,11 | 1,12 |
| 85-89 | 74,61 | -5,70% | 1,27 | 1,11 | 1,14 |
| 90-94 | 83,62 | 5,68% | 1,23 | 1,08 | 1,14 |
| 95+ | 87,30 | 10,34% | 1,25 | 1,19 | 1,05 |

# 5. BIJLAGEN

## A. Variantieanalyse (ANOVA), behalve Brussel

| Statistische relevantie van de vastgestelde verschillen in 2025 | | |
|---|---|---|
| ***Volgens gewest?*** | Nee | NS |
| ***Volgens geslacht?*** | NA | NA |
| ***Volgens terugbetalingsregeling?*** | Ja | * |
| ***Volgens geslacht en per gewest?*** | NA | NA |
| ***Volgens terugbetalingsregeling en per gewest?*** | Nee | NS |
| ***Volgens geslacht en per terugbetalingsregeling?*** | NA | NA |
| ***Volgens geslacht en terugbetalingsregeling en per gewest?*** | NA | NA |


Teneinde de relevantie van de vastgestelde verschillen te kunnen evalueren, werd een lineair mixed ANOVA model gefit op de gegevens van alle arrondissementen* van het Waalse en Vlaamse gewest, na standaardiseren volgens leeftijd. Het model bevat de factoren regio, geslacht en terugbetalingsregeling als fixed effecten en ook alle tweewegs interacties en de driewegsinteractie.

Om het model correct te interpreteren, moet eerst de driewegs interactie geëvalueerd worden, gevolgd door de tweewegs interacties en daarna door de hoofdeffecten. Als de driewegsinteractie significant is, moet elke interpretatie van het model op dit niveau gebeuren, terwijl de tweewegs interacties en hoofdeffecten dan niet geïnterpreteerd worden. Als de driewegsinteractie niet significant is, worden de tweewegsinteracties geëvalueerd. Elk hoofdeffect dat deel uitmaakt van een significante interactie, moet op het niveau van de interactie worden geïnterpreteerd en niet op het niveau van het hoofdeffect. Enkel wanneer een hoofdeffect geen deel uitmaakt van een significante interactie, kan het rechtstreeks geïnterpreteerd worden.

De asterisken tonen de graad van statistische significante van de testen: ***** P-waarde ≤ 0,05 / ****** P-waarde ≤ 0,01 / ******* P-waarde ≤ 0,001 en NS bij een statistisch niet significant resultaat.

## B. Frequentie van herhalingen van de praktijk (per patiënt)

**Gemiddeld aantal prestaties per dag per patiënt: 1,09**





**Verdeling van de patiëntdagen volgens de herhaling van de praktijk per dag (2024)**

Soms worden verscheidene codes (gelijkaardig of verschillend) die betrekking hebben op dezelfde praktijk op de-zelfde dag voor dezelfde patiënt gefactureerd.


Dit taartdiagram toont de verdeling van de patiëntdagen volgens het aantal prestaties uitgevoerd op dezelfde dag voor dezelfde patiënt.

Deze analyses betreffende de frequentie van de gevallen worden uitgevoerd voor het jaar **2024** op basis van de volgende gegevens: documenten P, ADH en AZV.




**Gemiddeld aantal prestaties <u>per dag</u> per patiënt per provincie en variatie ten opzichte van het nationale gemiddelde (2024)**

**Gemiddeld aantal dagen per patiënt in het jaar: 1,20**





**Verdeling van patiënten volgens herhaling van de praktijk in het jaar (2024)**

Rekening houdend met de herhaling per dag, is het ook mogelijk dat een of meer prestaties van dezelfde praktijk op verschillende dagen worden gefactureerd voor dezelfde patiënt tijdens hetzelfde jaar.


Dit histogram toont de verdeling van patiënten volgens de herhaling van de praktijk in een jaar (waarin de herhaling per dag niet is opgenomen).

Er werd rekening gehouden met het jaar **2024** om de herhaling van de verstrekkingen te berekenen (uit de volgende databases: Documenten P, ADH en AZV).




**Gemiddeld aantal dagen per patiënt in het jaar per provincie en variatie ten opzichte van het nationaal gemiddelde (2024)**

## C. Types van tenlasteneming van de patiënt





**Verdeling van de types van tenlasteneming in 2024**


| Zorgsettings | |
|---|---|
| **Ambulant (privé)** | 32,4% |
| **Ambulant (polikliniek)** | 29,4% |
| **(Dag)ziekenhuis** | 33,8% |
| **Ziekenhuis (verblijf)** | 4,4% |

In aanvulling op het hoofdstuk betreffende de frequentie van ambulante verstrekkingen (zie sectie 4.C), kan de analyse van de types van tenlasteneming van de patiënt worden verfijnd door de subsectoren van ambulante verzorging (privé en polikliniek) en ziekenhuisverzorging (daghospitalisatie of klassieke hospitalisatie) te identificeren.

Deze analyses worden uitgevoerd voor het jaar **2024** op basis van de volgende gegevens: documenten P, ADH en AZV.




**Verdeling van de types van tenlasteneming per provincie (2024)**





**Evolutie van de verdeling van de types van tenlasteneming (van verstrekkingen), per jaar**

Deze grafiek illustreert de verdeling van de tenlasteneming per verstrekking, waardoor de evolutie ervan in de periode 2015-2025 kan worden gevolgd. (In het geval van klinisch-biologische prestaties kan echter geen onderscheid worden gemaakt tussen verschillende ambulante types).

De links geplaatste schaal verwijst naar de verdeling per sector in % ("bars"). Indien van toepassing verwijst de rechts geplaatste schaal naar het percentage dagopnames ten opzichte van het totale aantal ziekenhuisopnames, in % (witte blokjes).

## D. Coderingsvariaties en praktijkalternatieven

### ➔ Variaties in de codering:




**Verdeling volgens volume van de nomenclatuurcodes**


| Gecombineerde codes | Omschrijving |
|---|---|
| **Other** | Andere codes |
| **432832-432843** | Inspuiting van echogeen contrastmiddel voor hysterosalpingo-(foam)sonografie ter beoordeling van de uteriene caviteit ... |
| **432412-432423** | Therapeutische hysteroscopie voor exeresis van een poliep of voor myomectomie of voor resectie van intra-uteriene ... |
| **432390-432401** | Diagnostische hysteroscopie met of zonder biopsie of cytologie, met protocol |
| **432294-432305** | Conisatie van de baarmoederhals met anatomopathologische bevestiging |
| **431955-431966** | ** Microscopische colposcopie |
| **431410-431421** | Kymografische insufflatie der eileiders en/of inspuiting van contrastmiddel voor hysterosalpingografie en/of ... |
| **220290-220301** | ° Baarmoedercurettage, curatieve of exploratieve, eventueel inclusief dilatatie en afname voor endo-uterine biopsie |

| Relevantie | Per gewest | Per provincie |
|---|---|---|
| Gebruik van **Nomenclatuurcodes**[1] | *** | *** |

De **asterisken** tonen de graad van statistische significantie van de Chi-square test: * P-waarde ≤ 0,05 / ** P-waarde ≤ 0,01 / *** P-waarde ≤ 0,001. NS en NA geven aan dat de variaties respectievelijk niet significant of niet van toepassing zijn.

[1] De berekening van de significantie wordt hier uitgevoerd door de geografische verschillen in het gebruik van verschillende nomenclatuurcodes te vergelijken voor de praktijk.

➔ **Variatie in gebruik van laagvariabele zorg:**




**Verdeling volgens volume van de pseudocodes voor laagvariabele zorg**

| Pseudocodes | Omschrijving |
|---|---|
| | *Grijs: Prestaties buiten laagvariabele zorg* |
| **Other** | Andere pseudocodes voor laagvariabele zorg |
| **798641** | Groep patiëntes die een totale of subtotale hysterectomie ondergaan heeft, in klassieke hospitalisatie, met ernstgraad 1. |

| Relevantie | Per gewest | Per provincie |
|---|---|---|
| Gebruik van **Laagvariabele zorg**[1] | *** | *** |

[1] De berekening van de significantie wordt hier uitgevoerd door het gebruik van de laag-variabele zorg in zijn geheel te vergelijken met het niet-gebruiken van deze forfaits.