

Geneesmiddelenverbruik in openbare officina's

Anticholinergica (65 en ouder) (min 80 DDD)

Analyse van de verdeling en van de evolutie van het verbruik in volumes en in uitgaven per verzekerde in België
(analyses en tendensen per gewest, provincie en arrondissement) voor **2023**



RIZIV – Dienst voor Geneeskundige Verzorging – Directie Onderzoek, Ontwikkeling en Kwaliteitspromotie

Cel Doelmatige Zorg

Pascal Meeus, Lies Gryndonck, Virginie Dalcq, Benjamin Swine, Marc De Falleur, Katrien Declercq, Delphine Beauport
Contact : appropriatecare@riziv-inami.fgov.be

Datum van dit rapport : 2 november 2024

INHOUDSTAFEL

INHOUDSTAFEL	2
1. INLEIDING	4
2. METHODOLOGIE	5
A. ATC-(ANATOMICAL THERAPEUTIC CHEMICAL CLASSIFICATION SYSTEM)CODES DIE IN DE ANALYSE ZIJN OPGENOMEN	5
B. GEGEVENSBRON EN ANALYSEPERIODE	8
C. SELECTIECRITERIA	9
D. STANDAARDISATIE	9
3. RESULTATEN	10
3.1. PROFIEL VAN DE VERZEKERDE VERBRUIKERS	10
A. VOLUME VAN DE VERZEKERDE VERBRUIKERS.....	10
B. VERZEKERDE VERBRUIKERS PER GESLACHT EN PER LEEFTIJD	11
C. VERZEKERDE VERBRUIKERS VOLGENS DE TERUGBETALINGSREGELING	15
D. GEOGRAFISCHE VARIATIES VAN DE VERZEKERDE VERBRUIKERS.....	16
E. EVOLUTIE VAN DE VERZEKERDE VERBRUIKERS	20
3.2. VERBRUIK PER VERZEKERDE VERBRUIKER	21
A. HOEVEELHEID VERBRUIKTE GENEESMIDDELEN PER VERZEKERDE VERBRUIKER.....	21
B. VERDELING VAN VERZEKERDE VERBRUIKERS IN JAARLIJKSE DOSISKLASSEN EN NAAR GEMIDDELDE JAARDOSIS.....	21
C. GEMIDDELDE HOEVEELHEID VERBRUIKTE GENEESMIDDELEN PER GESLACHT EN LEEFTIJD PER VERZEKERDE VERBRUIKER.....	23
D. GEMIDDELDE HOEVEELHEID VERBRUIKTE GENEESMIDDELEN PER VERZEKERDE VERBRUIKER PER PROVINCIE	24
E. GEMIDDELDE HOEVEELHEID VERBRUIKTE GENEESMIDDELEN PER VERZEKERDE VERBRUIKER PER SOCIAAL STATUUT EN PER PROVINCIE.....	25
3.3. VOLUME VOORGESCHREVEN GENEESMIDDELEN	26
A. VERBRUIK VAN DDD PER 100.000 VERZEKERDEN	26
B. VERDELING IN VOLUMES (DDD) VAN DE VERSTREKTE ATC-CODES	27
C. SPECIALISME VAN DE VOORSCHRIJVERS	28
D. EVOLUTIE VAN HET VERBRUIK VAN DDD PER 100.000 VERZEKERDEN.....	29

3.4. UITGAVEN TEN LASTE VAN DE ZIEKTEVERZEKERING EN VAN DE VERZEKERDE	33
A. UITGAVEN TEN LASTE VAN DE ZIEKTEVERZEKERING.....	33
B. EVOLUTIE VAN DE UITGAVEN PER VERZEKERDE	35
C. EVOLUTIE VAN DE UITGAVEN PER ATC-CODE EN PER DDD.....	37
D. UITGAVEN TEN LASTE VAN DE VERZEKERDE VERBRUIKER (AANDEEL VAN DE PATIËNT)	38
4. SAMENVATTING VAN DE BELANGRIJKSTE GEGEVENS.....	39
5. BIJLAGEN	40
A. VARIANTIEANALYSE (ANOVA), BEHALVE BRUSSEL (OP BASIS VAN DE VERZEKERDE VERBRUIKERS).....	40
B. PERCENTAGE GOEDKOPE GENEESMIDDELEN	41
C. VARIATIES IN SOORT VERSTREKTE GENEESMIDDELEN (OP BASIS VAN DDD)	44
D. VERKOOPVOLUMES BUITEN DE ZIEKTEVERZEKERING OM	46

1. INLEIDING

De Cel Doelmatige Zorg binnen de Directie Onderzoek-Ontwikkeling-Kwaliteitspromotie van de Dienst voor Geneeskundige Verzorging van het RIZIV werd opgericht als gevolg van de Bestuursovereenkomst 2016-2018 van het RIZIV¹. In artikel 35 wordt in "de oprichting van een Cel doelmatige zorg met specifieke focus op een geïntegreerde aanpak voor een rationeel gebruik van de middelen" voorzien. Het project met het oog op de oprichting van de Cel Doelmatige Zorg is in het tweede trimester 2017 gelanceerd.

De concrete oprichting van de cel is geformaliseerd in het "Actieplan handhaving in de gezondheidszorg 2016-2017" dat het RIZIV op 18 juli 2016 heeft gepubliceerd². In dat plan worden een dertigtal maatregelen opgesomd om de gezondheidszorg efficiënter te maken door een adequate praktijkvoering te bevorderen en nutteloze of ongeschikte zorg te bestrijden.

Hierin is overeengekomen dat een van de opdrachten van de Cel Doelmatige Zorg bestaat in een analyse van de "relevantie van de zorg" waarbij het de bedoeling is om onverklaarbare variaties in de consumptie na standaardisatie op te sporen. Die variaties kunnen namelijk wijzen op een mogelijke niet-optimale benutting van de middelen.

De verslagen "Geneesmiddelenverbruik" bevatten de in dit kader uitgevoerde analyses. In elk rapport komt een welbepaald thema aan bod. In dit document worden de becijferde resultaten en grafieken van de analyses³ van de verzekerde verbruikers van « Anticholinergica (65 en ouder) (min 80 DDD)» en van de in het kader van de ziekteverzekering verstrekte volumes (gelijkgesteld met hun verbruik) weergegeven, alsook de belangrijkste leessleutels aangereikt.

We hebben aan dit document bewust geen interpretatie toegevoegd, aangezien we deze vaststellingen eerst wilden voorleggen aan de professionele zorgverleners die het best in staat zijn om ze te interpreteren. Dit document is echter vrij toegankelijk om de reflectie over het thema objectief en openlijk te voeren.

¹ (Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, 2016)

² (Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, 2016)

³ Er wordt verwezen naar het document "Verbruiksvariaties - Methode" waar de geïnteresseerde lezer meer uitleg kan vinden over de methode die voor deze kwantitatieve analyses is gebruikt.

2. METHODOLOGIE

A. ATC-(Anatomical Therapeutic Chemical Classification System)codes die in de analyse zijn opgenomen

De ATC-codes die in de analyse zijn opgenomen, worden hieronder opgesomd:

Geneesmiddelen – Anticholinergica (65 en ouder) (min 80 DDD)

ATC-Code	Beschrijving	Aantallen	Uitgaven	CodeGroep	
N06AA02	IMIPRAMINE	Ja	Ja	1_Antidepressant	
N06AA04	CLOMIPRAMINE	Ja	Ja		
N06AA09	AMITRIPTYLINE	Ja	Ja		
N06AA10	NORTRIPTYLINE	Ja	Ja		
N06AA12	DOXEPINE	Ja	Ja		
N06AA16	DOSULEPINE	Ja	Ja		
N06AB03	FLUOXETINE	Ja	Ja		
N06AB04	CITALOPRAM	Ja	Ja		
N06AB05	PAROXETINE	Ja	Ja		
N06AB10	ESCITALOPRAM	Ja	Ja		
N06AX05	TRAZODON	Ja	Ja		
N06AX11	MIRTAZAPINE	Ja	Ja		
A02BA01	CIMETIDINE	Ja	Ja		2_Other_drug
A02BA02	RANITIDINE	Ja	Ja		
A03FA03	DOMPERIDON	Ja	Ja		
A07DA03	LOPERAMIDE	Ja	Ja		
A07DA53	LOPERAMIDE, COMBINATIEPREPARATEN	Ja	Ja		
G04BD04	OXYBUTYLINE	Ja	Ja		
G04BD07	TOLTERODINE	Ja	Ja		
G04BE07	APOMORFINE	Ja	Ja		
M03BX02	TIZANIDINE	Ja	Ja		
N02AA01	MORFINE	Ja	Ja		
N02AA05	OXYCODON	Ja	Ja		
N02AA08	DIHYDROCODEINE	Ja	Ja		
N02AA51	MORFINE, COMBINATIEPREPARATEN	Ja	Ja		
N02AA59	CODEINE, COMBINATIEPREPARATEN	Ja	Ja		
N02AB03	FENTANYL	Ja	Ja		
N02AX02	TRAMADOL	Ja	Ja		
N03AE01	CLONAZEPAM	Ja	Ja		
N03AF01	CARBAMAZEPINE	Ja	Ja		
N04AA01	TRIHXYFENIDYL	Ja	Ja		
N04BB01	AMANTADINE	Ja	Ja		
N05AA02	LEVOMEPRMAZINE	Ja	Ja		
N05AD01	HALOPERIDOL	Ja	Ja		
N05AH02	CLOZAPINE	Ja	Ja		
N05AH03	OLANZAPINE	Ja	Ja		
N05AH04	QUETIAPINE	Ja	Ja		
N05AX08	RISPERIDON	Ja	Ja		
N05BA01	DIAZEPAM	Ja	Ja		
N05BB01	HYDROXYZINE	Ja	Ja		
N05CD05	TRIAZOLAM	Ja	Ja		
R03AL01	FENOTEROL MET IPRATROPIUMBROMIDE	Ja	Ja		
R03AL02	SALBUTAMOL MET IPRATROPIUMBROMIDE	Ja	Ja		
R03BB01	IPRATROPIUM BROMIDE	Ja	Ja		
R03DA04	THEOFYLLINE	Ja	Ja		
R03DA54	THEOFYLLINE, COMBINATIEPREPARATEN EXCL. PSYCHOLEPTICA	Ja	Ja		
R03DA74	THEOFYLLINE, COMBINATIEPREPARATEN MET PSYCHOLEPTICA	Ja	Ja		
R05DA01	ETHYLMORFINE	Ja	Ja		
R05DA04	CODEINE	Ja	Ja		
R06AA02	DIFENHYDRAMINE	Ja	Ja		

Deze (vereenvoudigde) tabel bevat de ATC-codes die in de analyse opgenomen zijn met vermelding van hun eventuele opname in de analyse van de voorschriften en de uitgaven, met hun label. De in dit rapport gebruikte groeperingen van ATC-codes staan in de kolommen CodeGroepen (indien toepasselijk). Geneesmiddelen die als "goedkoop" worden beschouwd, staan vermeld [op de website van het RIZIV](#).

B. Gegevensbron en analyseperiode

De gegevens die in de analyses zijn opgenomen, zijn afkomstig van deze databanken:

Document Farmanet	Voor het percentage verzekerde verbruikers, het volume van de verstrekte geneesmiddelen (gelijk aan het geneesmiddelenverbruik en omgezet in DDD per 100.000 verzekerden) en de uitgaven van de verzekerden (die aan de selectiecriteria voldoen) waarvan de leeftijd, het geslacht, de voorkeursregeling en het arrondissement in 2020-2023 gekend zijn. De gegevens worden verzameld per boekhoudkundige periode.
------------------------------	---

Analyseperiode	2020-2023
-----------------------	-----------



Farmanet-documenten: Farmanet-documenten zijn gegevens van openbare officina's die door de tarifieringsdiensten worden meegedeeld in het kader van de verzekering Geneeskundige verzorging. Die gegevens bevatten informatie over de verstrekte voorschriften, d.w.z. de identificatiecode van de verstrekte stof, het aantal verpakkingen, de datum van verkoop, een versleutelde patiëntencode en de code van de voorschrijver. **Die gegevens hebben voornamelijk betrekking op de in het kader van de ziekteverzekering terugbetaalde geneesmiddelen.**

De verpakkingen worden vervolgens omgezet in DDD (Defined Daily Dose) volgens de referenties van de Wereldgezondheidsorganisatie. Het IFEB (Instituut voor Farmaco-Epidemiologie in België) legt uit dat deze dagelijkse dosis overeenkomt met de gemiddelde aangenomen onderhoudsdosis per dag voor een geneesmiddel dat door een volwassene wordt gebruikt voor de hoofdindicatie. Er wordt rekening gehouden met de toedieningsweg: bijvoorbeeld dat de DDD van morfine 100 mg oraal en 30 mg parenteraal of rectaal is.

De goedkope geneesmiddelen worden geïdentificeerd op basis van hun CNK-code (De CNK-code is een uniek identificatienummer per verpakking dat wordt toegekend aan alle geneesmiddelen en farmaceutische producten (medische hulpmiddelen, voedingssupplementen, cosmetica...) die in de apotheek worden verstrekt).

In Farmanet wordt ook de volgende informatie over patiënten meegedeeld: leeftijd, geslacht, sociale categorie en arrondissement van de woonplaats.

Door een kruising van de code van de voorschrijver met de gegevens van het RIZIV kan de specialiteit van de voorschrijver worden opgevraagd.

Tenslotte maakt de vergelijking van Farmanet met de databank "LMPB – IQVIA" (de verkoop van groothandelaren aan openbare officina's), omgezet in DDD, het mogelijk het aandeel van geneesmiddelen die buiten de verzekering om worden geleverd, bij benadering te schatten.

C. Selectiecriteria

Er werden sommige filters op de gegevens toegepast om slechts een deel van de populatie of voorschrijvers in de analyses te selecteren. De toegepaste filters zullen indien nodig in de onderstaande tabel worden weergegeven:

OP DE GEGEVENS TOEGEPASTE FILTERS	
Geslacht	vrouwen en mannen
Leeftijd	>=65
Andere	Min 80 ddd per geneesmiddel per jaar

D. Standaardisatie

Gegevens weergegeven per geografische deelgroep* of bevolkingscategorie worden gestandaardiseerd per jaar op basis van de leeftijd, het geslacht en de voorkeursregeling van de nationale bevolking in 2023.

Opmerking: Arrondissementen met minder dan 100.000 verzekerden zijn samengevoegd met een aangrenzend arrondissement uit dezelfde provincie. De volgende arrondissementen worden daarom samen beschouwd: Oostende/Veurne, Ieper/Diksmuide, Roeselare/Tielt, Gent/Eeklo, Charleroi/Thuin, Huy/Waremme, Namur/Philippeville, Neufchâteau/Marche-en-Famenne, Virton/Bastogne/Arlon. Deze groepen en namen zijn van toepassing op alle metingen, kaarten en grafieken die per arrondissement worden geproduceerd. In het hele document wordt het concept van gegroepeerd arrondissement weerspiegeld in het gebruik van de term "arrondissement"

Standaardisatie is een proces waarmee populaties voor een of meer analysecriteria vergelijkbaar worden gemaakt. Als er een verschil tussen die populaties wordt waargenomen, zal hieruit dus kunnen worden afgeleid dat dit verschil niet te wijten is aan de criteria die bij de standaardisatie in aanmerking zijn genomen.

3. RESULTATEN

3.1. Profiel van de verzekerde gebruikers

A. Volume van de verzekerde gebruikers

	TOTAAL
<i>Aantal gebruikers</i>	430.375
Percentage verzekerde gebruikers	17,77%

B. Verzekerde gebruikers per geslacht en per leeftijd


	TOTAAL
<i>Aantal verzekerde gebruikers</i>	430.375
Mediane leeftijd (jaar)	75
Gemiddelde leeftijd (jaar)	76,64
Max./Min. ratio van de mediane leeftijd (per arrondissement*)	1,04
Percentage vrouwen	65,54%

Max./Min. ratio:

De max./min. ratio is een spreidingsmaat voor de waarden. Die wordt in dit rapport berekend via de verhouding tussen de teruggevonden maximale waarde voor de variabele in alle arrondissementen* en de minimale waarde, outliers uitgesloten. Als die minimumwaarde gelijk is aan nul, dan kan de max./min. ratio niet worden berekend en zal er "NA" (d.w.z. "not applicable") worden vermeld.

* Sommige arrondissementen zijn gegroepeerd, zie pagina 7, Standaardisatie

Geneesmiddelen – Anticholinergica (65 en ouder) (min 80 DDD)




Percentage verzekerde verbruikers en variatiecoëfficiënt per arrondissement*, per leeftijdscategorie en geslacht

Deze grafiek bestaat uit staafdiagrammen voor elk geslacht. De **variatioecoëfficiënt**, weergegeven met de rode lijn, is een relatieve spreidingsmaat voor de vastgestelde percentages verzekerde verbruikers per arrondissement*, leeftijdscategorie en geslacht (de standaardafwijking gedeeld door het gemiddelde). Deze lijn wordt in het vet weergegeven voor de leeftijdscategorieën waarin de variatioecoëfficiënt geldig kan worden geïnterpreteerd (d.w.z. voor de leeftijdscategorieën met voldoende verzekerden per arrondissement* om te kunnen vergelijken).


De linkse verticale as van de grafiek stemt overeen met het percentage verzekerde verbruikers en de rechtse met de variatioecoëfficiënt. De horizontale as toont de uitsplitsing per leeftijdscategorie. De horizontale stippellijnen geven de totale waarden van het percentage verzekerde verbruikers (in het blauw) en de variatioecoëfficiënt (in het rood) weer.

Geneesmiddelen – Anticholinergica (65 en ouder) (min 80 DDD)



Vergelijking van het percentage verzekerde verbruikers per leeftijdscategorie en geslacht

Geneesmiddelen – Anticholinergica (65 en ouder) (min 80 DDD)




Dit histogram toont het percentage verzekerde verbruikers per provincie en per geslacht. De grijze balkjes geven de percentages mannen weer terwijl de groene balkjes voor elke provincie de percentages vrouwen laten zien. De grijze en groene streepjeslijnen tonen het percentage verzekerde verbruikers volgens dezelfde kleurcode.

Percentage verzekerde verbruikers per provincie

C. Verzekerde verbruikers volgens de terugbetalingsregeling

	TOTAAL
<i>Aantal verzekerde verbruikers</i>	430.375
% verzekerde verbruikers met voorkeurregeling	24,17%
% verzekerde verbruikers met algemene regeling	15,65%
Ratio Voorkeurregeling/Algemene regeling	1,54



De grafiek geeft de percentages verzekerde verbruikers weer met (in het rood) en zonder (in het grijs) voorkeurregeling, per gewest en in totaal. De rode en grijze stippellijnen geven de percentages verzekerde verbruikers weer, respectievelijk met en zonder voorkeurregeling.


Percentage verzekerde verbruikers per terugbetalingsregeling en per gewest

D. Geografische variaties van de verzekerde verbruikers

	TOTAAL
<i>Aantal verzekerde verbruikers</i>	430.375
Variatiecoëfficiënt	11,84%
Max./Min. ratio van de percentages verzekerde verbruikers (per gewest)	1,23
Max./Min. ratio van de percentages verzekerde verbruikers (per arrondissement*)	1,52

Een resultaat "NA" wordt vermeld bij een niet berekenbare ratio, d.w.z. als de minimumwaarde gelijk is aan nul.

Geneesmiddelen – Anticholinergica (65 en ouder) (min 80 DDD)



Een **dotplot**-grafiek is een spreidingsdiagram dat nuttig is om de aandacht te vestigen op groeperingen van gegevens, gaten in de verdeling of op extreme waarden. In dit geval geeft elk punt het percentage verzekerde verbruikers van een arrondissement* weer voor de volledige populatie of per geslacht.

De grafiek toont ook een box met het 25^{ste}, 50^{ste} en 75^{ste} percentiel van het % verbruikers voor alle arrondissementen*. De lijn onderaan de box stemt overeen met het 25^{ste} percentiel terwijl het 75^{ste} percentiel wordt weergegeven door de bovenste lijn. De lijn in de box stemt overeen met het 50^{ste} percentiel.

"Dotplot-verdeling" van de percentages verzekerde verbruikers per arrondissement* en per geslacht

Geneesmiddelen – Anticholinergica (65 en ouder) (min 80 DDD)



Kaart met de verdeling per arrondissement* van de percentages verzekerde gebruikers


* Arrondissementen aangeduid met * of + zijn gegroepeerd binnen dezelfde provincie. zie pagina 7, Standaardisatie

Op deze kaart van België worden de arrondissementsgrenzen met fijne lijnen en de provinciegrenzen met dikke lijnen aangegeven. De arrondissementen* zijn ingekleurd aan de hand van een kleurenschaal die gebaseerd is op de verhouding tussen de gebruiksstatistiek in dat arrondissement* en de nationale Belgische (totale) gebruiksstatistiek. Die verhouding wordt uitgedrukt in percentages: bijvoorbeeld 0% als de ratio van het arrondissement* gelijk is aan het nationaal percentage verzekerde gebruikers, 20% als het percentage verzekerde gebruikers 20% hoger ligt en -20% als het percentage verzekerde gebruikers 20% lager ligt. De verschillen worden berekend op basis van het laatste onderzochte jaar en worden in schijven van 20% verdeeld. De volgende kleuren worden gebruikt:

Kleur	Categorie
■	Meer dan 50%
■	Tussen 30% en 50%
■	Tussen 10% en 30%
■	Tussen -10% en 10%
■	Tussen -30% en -10%
■	Tussen -50% en -30%
■	Minder dan -50%
■	Geen verbruik

N.B.: De interpretatie van deze kaart moet parallel gebeuren met die van de grafiek in funnelplot (volgende p.)

Geneesmiddelen – Anticholinergica (65 en ouder) (min 80 DDD)




In deze grafiek wordt de percentages verzekerde verbruikers in een arrondissement* gepositioneerd ten opzichte van het bevolkingsaantal. Naast de punten per arrondissement* worden ook de 95% en 99.7% **betrouwbaarheidsintervallen** op de grafiek weergegeven. Deze hangen af van het bevolkingsaantal. De dikke horizontale lijn geeft het nationale percentage verzekerde verbruikers weer. De extreme arrondissementen* worden geïdentificeerd door de punten die buiten de 99.7% betrouwbaarheidsintervallen vallen. De zone tussen beide betrouwbaarheidsintervallen wordt als "warning zone" beschouwd.

N.B.: De interpretatie van deze grafiek moet parallel gebeuren met die van de verdelingskaart van het percentage verzekerde verbruikers (vorige p.)

"Funnelplot" van de percentages verzekerde verbruikers per arrondissement*

E. Evolutie van de verzekerde verbruikers




Evolutie per provincie van het percentage verzekerde verbruikers

3.2. Verbruik per verzekerde verbruiker

A. Hoeveelheid verbruikte geneesmiddelen per verzekerde verbruiker

	TOTAAL
<i>Jaarlijks geneesmiddelenverbruik (DDD)</i>	135.281.540
<i>Aantal verbruikers</i>	430.375
<i>Percentage verzekerde verbruikers</i>	17,77%
<i>Aantal DDD per verzekerde verbruiker</i>	314

B. Verdeling van verzekerde verbruikers in jaarlijkse dosisklassen en naar gemiddelde jaardosis




Verdeling van verzekerde verbruikers in jaarlijkse dosisklassen

De verzekerde verbruikers worden verdeeld in klassen volgens hun jaarlijkse verbruik.

Hoge frequenties (pieken) in verschillende klassen kunnen wijzen op verschillen in **behandelingsduur** of **dose-ring** (afhankelijk van het voorschrift, het profiel van de patiënt, de pathologie, de therapietrouw, ...), maar kunnen ook het gevolg zijn van andere oorzaken, zoals herhaling van episodes in de loop van het jaar of de timing van het begin van een chronische behandeling.

Geneesmiddelen – Anticholinergica (65 en ouder) (min 80 DDD)

Frequentie	Per jaar
≤ 0,5 keer het gemiddelde jaarlijkse verbruik	31,77%
>0,5 en ≤1 keer het gemiddelde jaarlijkse verbruik	31,99%
>1 en ≤2 keer het gemiddelde verbruik	27,04%
>2 en ≤ 3 keer het gemiddelde verbruik	6,33%
> 3 keer het gemiddelde jaarlijkse verbruik	2,87%




Verdeling van verzekerde verbruikers per gemiddelde geleverde jaardosis

De verzekerde verbruikers worden verdeeld volgens hun verbruik in verhouding tot de nationale gemiddelde dosis. Variaties in dosissen kunnen wijzen op verschillen in **behandelingsduur** of **dosering** (afhankelijk van het voorschrift, het profiel van de patiënt, de pathologie, de therapietrouw, ...), maar kunnen ook het gevolg zijn van andere oorzaken, zoals herhaling van episodes in de loop van het jaar of de timing van het begin van een chronische behandeling.

Geneesmiddelen – Anticholinergica (65 en ouder) (min 80 DDD)


C. Gemiddelde hoeveelheid verbruikte geneesmiddelen per geslacht en leeftijd per verzekerde gebruiker

	Vrouwen	Mannen	Ratio V/M
Percentage verzekerde gebruikers	20,6%	14,2%	1,45
Aantal DDD per verzekerde gebruiker	317,1	308,9	1,03



Geneesmiddelen – Anticholinergica (65 en ouder) (min 80 DDD)

D. Gemiddelde hoeveelheid verbruikte geneesmiddelen per verzekerde verbruiker per provincie



De gearceerde lijn komt overeen met het gemiddelde verbruik in DDD per patiënt. De indicator wordt berekend door het totale verbruik in DDD te delen door het aantal verzekerden die in het beschouwde jaar geneesmiddelen van de geselecteerde klasse hebben gekregen.


De balkjes per provincie illustreren het verschil in verbruik in DDD per verzekerde verbruiker ten opzichte van het nationale gemiddelde.

Verbruik per verzekerde verbruiker (DDD) per provincie en variatie ten opzichte van de gemiddelde nationale waarde

Geneesmiddelen – Anticholinergica (65 en ouder) (min 80 DDD)

E. Gemiddelde hoeveelheid verbruikte geneesmiddelen per verzekerde gebruiker per sociaal statuut en per provincie

	Voorkeur regeling	Algemene regeling	Ratio Voorkeurregeling/ Algemene regeling
Percentage verzekerde gebruikers	24,2%	15,7%	1,54
Aantal DDD per verzekerde gebruiker	343,8	301,2	1,14




Verbruik per verzekerde gebruiker (DDD) per provincie en per sociaal statuut

3.3. Volume voorgeschreven geneesmiddelen

A. Verbruik van DDD per 100.000 verzekerden

	TOTAAL
<i>Geneesmiddelenverbruik per jaar (DDD)</i>	135.281.540
Verbruik van DDD per 100.000 verzekerden (verstrekke geneesmiddelen omgezet in DDD)	5.585.025

B. Verdeling in volumes (DDD) van de verstrekte ATC-codes



Zie ATC-codes die in de analyse zijn opgenomen op pagina 5 voor informatie over die codes (Voor de leesbaarheid is de lijst beperkt tot de 23 meest gebruikte ATC-codes).

N.B.: Het jaar 2020 werd aangegeven door een verticale lijn om de aandacht te vestigen op de impact van de COVID-19 crisis.

C. Specialisme van de voorschrijvers

Specialisatie voorschrijver	Aantal voorschrijvers	Aantal voorschrijvers codes	% voorschrijvers codes	Mediaan aantal ddd	Q3 aantal ddd	Aantal ddd	% DDD	% goedkope DDD	Uitgaven	% Uitgaven
Huisartsen	20.130	14.658	73%	5.720	11.965	115.182.981	85%	87%	36.096.484	84%
Huisartsen in opleiding	6.058	3.631	60%	815	2.204	5.439.604	4%	84%	1.688.636	4%
Psychiatrie	2.379	1.458	61%	1.460	3.677	4.107.958	3%	86%	1.894.499	4%
Pneumologie	835	616	74%	1.464	3.166	1.468.824	1%	40%	463.604	1%
Specialisten in opleiding	9.801	3.515	36%	184	498	1.400.529	1%	85%	482.388	1%
Neurologie	799	631	79%	1.157	2.763	1.367.939	1%	90%	377.487	1%
Andere specialiteiten	46.032	12.020	26%	341	640	6.313.705	5%	89%	1.869.188	4%
Totaal	86.034	36.529	42%	725	4.436	135.281.540	100%	86%	42.872.285	100%



In deze tabel worden respectievelijk de volgende niet-gestandaardiseerde gegevens per medisch specialisme weergegeven (cijfers voor het jaar 2023):

- Het aantal voorschrijvers die minstens een verstrekt geneesmiddel hebben voorgeschreven;
- Het aantal voorschrijvers die de verstrekte ATC-codes voorschrijven die in deze analyse opgenomen zijn;
- Het percentage voorschrijvers die die codes voorschrijven ten opzichte van het aantal zorgverleners die minstens een verstrekt geneesmiddel hebben voorgeschreven;
- Het mediane aantal en het derde kwartiel (= 75e percentiel) van verstrekkingen per voorschrijver (die de codes voorschrijven);
- Het volume van de voorgeschreven DDD, d.w.z. het verkoopvolume van in DDD omgezette geneesmiddelen, uitgesplitst naar specialisme van de voorschrijver;
- Het percentage voorgeschreven geneesmiddelen, d.w.z. de verhouding van het aantal door die specialiteit verstrekte geneesmiddelen ten opzichte van het totaal aantal voorgeschreven geneesmiddelen onder de geselecteerde ATC-codes;
- Het percentage goedkope geneesmiddelen, d.w.z. de verhouding van het aantal als "goedkoop" geïdentificeerde geneesmiddelen per nationaal codenummer (CNK) ten opzichte van de verstrekte geneesmiddelen onder de geselecteerde ATC-codes;
- De uitgaven zijn de totale door de ziekteverzekering gedragen kosten (exclusief eigen bijdrage van de patiënt en verkoop buiten de verzekering om);
- Het uitgavenpercentage is het aandeel van de uitgaven per voorschrijfspecialisme in de totale uitgaven.

Indien van toepassing worden specialismen die minder dan 1% van het totaal aantal voorgeschreven DDD's vertegenwoordigen of minder dan 5 voorschrijvers hebben, samengevoegd in de categorie "Overige specialismen". Om redenen van vertrouwelijkheid wordt deze categorie "Overige specialismen" alleen ingevuld als er in totaal ten minste 5 voorschrijvers zijn.


Geneesmiddelen – Anticholinergica (65 en ouder) (min 80 DDD)

D. Evolutie van het verbruik van DDD per 100.000 verzekerden

	TOTAAL	
Jaarlijks verbruik (DDD)	135.281.540	
Trend (2020-2023)	-0,09%	NS (-0,37%)
Trend (2020-2021)	0,31%	NA
Trend (2021-2023)	-0,28%	

De hier berekende trends stemmen overeen met het gemiddeld jaarlijks groeipercentage.

Een niet-significante statistische test wijst erop dat de trend geschat door het model (tussen haakjes) stabiel is, of dat er geen trendbreuk is.




Deze grafiek toont een gekleurde curve per gewest en een zwarte curve voor de volledige Belgische bevolking. Op de horizontale as worden de jaren weergegeven en op de verticale as het gestandaardiseerde verbruik van DDD per 100.000 verzekerden.

N.B.: Het jaar 2020 werd aangegeven door een verticale lijn om de aandacht te vestigen op de impact van de COVID-19 crisis.

Evolutie per gewest van het verbruik van DDD per 100.000 verzekerden

Geneesmiddelen – Anticholinergica (65 en ouder) (min 80 DDD)



Deze grafiek toont een gekleurde curve per provincie en een zwarte curve voor de volledige Belgische bevolking. Op de horizontale as worden de jaren weergegeven en op de verticale as het gestandaardiseerde verbruik van DDD per 100.000 verzekerden.

N.B.: Het jaar 2020 werd aangegeven door een verticale lijn om de aandacht te vestigen op de impact van de COVID-19 crisis.

Evolutie per provincie van het verbruik van DDD per 100.000 verzekerden

Geneesmiddelen – Anticholinergica (65 en ouder) (min 80 DDD)

		Verbruik in DDD	Jaarlijkse groei			Trendbreuk
		2023 (per 10 ⁵ verzekerden)	2020-2023	2020-2021	2021-2023	
Provincies	West-Vlaanderen	5.261.672	0,10%	-0,54%	0,42%	NA
	Oost-Vlaanderen	5.217.012	-0,01%	-0,59%	0,28%	NA
	Antwerpen	4.801.604	-0,43%	-1,74%	0,23%	NA
	Limburg	5.948.127	0,37%	-0,09%	0,60%	NA
	Vlaams-Brabant	5.326.024	-0,48%	2,06%	-1,73%	NA
	Brussel	5.168.976	0,46%	5,92%	-2,17%	NA
	Waals-Brabant	5.792.268	0,14%	0,89%	-0,23%	NA
	Henegouwen	6.388.512	-0,26%	0,61%	-0,69%	NA
	Luik	6.645.394	0,04%	0,73%	-0,30%	NA
	Namen	6.700.237	0,09%	0,35%	-0,04%	NA
	Luxemburg	6.298.725	-0,47%	-0,67%	-0,37%	NA
Gewesten	Vlaanderen	5.228.118	-0,11%	-0,36%	0,01%	NA
	Brussel	5.168.976	0,46%	5,92%	-2,17%	NA
	Wallonië	6.430.551	-0,09%	0,55%	-0,41%	NA
TOTAAL		5.585.025	-0,09%	0,31%	-0,28%	NA

Evolutie van het verbruik van DDD per provincie en per gewest


Deze tabel omvat het gestandaardiseerde verbruik van DDD voor het laatste geanalyseerde jaar (2023), maar ook de gemiddelde **groeipercentages** per provincie, per gewest en in het totaal, voor de lange termijn (2020-2023), voor de laatste jaren 2021-2023 en voor de periode ervoor (2020-2021).

Om na te gaan of de trend van de laatste jaren verschilt van de trend in de jaren die voorafgaan, wordt een lineair mixed model gefit in twee fasen. In de eerste fase wordt getest of de trend in de laatste jaren verschilt van de trend in de jaren die voorafgaan op nationaal niveau. Vervolgens wordt, als de test significant is, getest of de verandering van trend significant is op het niveau van elke provincie, elk gewest en nationaal. De gegevens van 2020 werden van de analyses uitgesloten.

De significantie van de trendbreuk wordt gerapporteerd in de trendbreukkolom: * P-waarde $\leq 0,05$ / ** P-waarde $\leq 0,01$ / *** P-waarde $\leq 0,001$ en NS voor een niet-significante trendbreuk.

De "NA"-waarden worden vermeld indien de ATC-codes die in de analyse opgenomen zijn een eerste volledige toepassingsjaar hebben dat recenter is dan de periode van de laatste drie in aanmerking genomen jaren of indien de statistische tests niet kunnen worden uitgevoerd.

Geneesmiddelen – Anticholinergica (65 en ouder) (min 80 DDD)



Regressielijnen per provincie met mogelijks een verschillende helling voor de laatste jaren (2021-2023) in vergelijking met die voor de jaren die aan deze periode vooraf gaan (2020-2021).

De gegevens van 2020 werden uitgesloten van de analyses maar zijn ter informatie aangegeven op de grafiek.

Trendbreuk beoordelingsmodel per provincie - Regressielijnen

3.4. Uitgaven ten laste van de ziekteverzekering en van de verzekerde

A. Uitgaven ten laste van de ziekteverzekering

	TOTAAL
<i>Jaarlijks verbruik (DDD)</i>	135.281.540
Jaarlijkse uitgaven	42.872.285€
Gemiddelde kost per DDD	0,32€
Gemiddelde jaarlijkse uitgaven per verzekerde	17,7€
Max./Min. ratio van de uitgaven per verzekerde (per gewest)	1,3
Max./Min. ratio van de uitgaven per verzekerde (per arrondissement*)	1,49

Een resultaat "NA" wordt vermeld bij een niet berekenbare ratio, d.w.z. als de minimumwaarde gelijk is aan nul.

Geneesmiddelen – Anticholinergica (65 en ouder) (min 80 DDD)


		Uitgaven per verzekerde
Provincies	West-Vlaanderen	17,4€
	Oost-Vlaanderen	17,5€
	Antwerpen	16,0€
	Limburg	19,7€
	Vlaams-Brabant	17,6€
	Brussel	14,8€
	Waals-Brabant	17,0€
	Henegouwen	19,2€
	Luik	19,8€
	Namen	20,4€
	Luxemburg	19,6€
	Gewesten	Vlaanderen
Brussel		14,8€
Wallonië		19,3€
TOTAAL		17,7€

Verdeling per gewest en provincie van de uitgaven per verzekerde

B. Evolutie van de uitgaven per verzekerde

	TOTAAL
Jaarlijkse uitgaven	42.872.285€
Gemiddelde jaarlijkse uitgaven per verzekerde	17,70€
Trend (2020-2023)	-0,84%
Trend (2020-2021)	-2,24%
Trend (2021-2023)	-0,14%

De hier berekende trends stemmen overeen met het gemiddeld jaarlijks groeipercentage.



Deze grafiek toont een gekleurde curve per gewest en een zwarte curve voor de volledige Belgische bevolking. Op de X-as bevinden zich de jaren en op de Y-as de gestandaardiseerde uitgaven op basis van de bevolking van 2023

N.B.: Het jaar 2020 werd aangegeven door een verticale lijn om de aandacht te vestigen op de impact van de COVID-19 crisis.

Evolutie per gewest van de uitgaven per verzekerde

Geneesmiddelen – Anticholinergica (65 en ouder) (min 80 DDD)



Kaart met de verdeling van de uitgaven per arrondissement*

* Arrondissementen aangeduid met * of + zijn gegroepeerd binnen dezelfde provincie. zie pagina 7, Standaardisatie

Op deze kaart van België worden de arrondissementsgrenzen met fijne lijnen en de provinciegrenzen met dikke lijnen afgebakend. De arrondissementen* zijn ingekleurd aan de hand van een kleurenschaal die is gebaseerd op de verhouding tussen de uitgaven in dat arrondissement* en de nationale Belgische (totale) uitgaven. Die verhouding wordt in percentages uitgedrukt : bijvoorbeeld 0 % als de uitgaven van het arrondissement* gelijk zijn aan de totale uitgaven, 20 % als de uitgaven 20 % hoger liggen en -20 % als de uitgaven 20 % lager liggen. De percentages worden berekend op basis van de gestandaardiseerde uitgaven van het laatste onderzochte jaar en worden per schijven van 20 % verdeeld. De volgende kleuren worden gebruikt:

Kleur	Categorie
Dark Red	Meer dan 50%
Red-Orange	Tussen 30% en 50%
Orange	Tussen 10% en 30%
Yellow	Tussen -10% en 10%
Light Green	Tussen -30% en -10%
Green	Tussen -50% en -30%
Dark Green	Minder dan -50%
White	Geen uitgave

C. Evolutie van de uitgaven per ATC-code en per DDD

Code_atc	Beschrijving	2020	2021	2022	2023	Gemiddeld jaarlijks groei%
G04BD04	OXYBUTYNINE	0,11	0,11	0,12	0,13	4,47%
N02AA05	OXYCODON	1,32	1,34	1,37	1,32	0,07%
N02AB03	FENTANYL	1,56	1,50	1,47	1,49	-1,62%
N02AX02	TRAMADOL	0,55	0,54	0,54	0,56	0,66%
N03AF01	CARBAMAZEPINE	0,50	0,50	0,50	0,53	1,94%
N05AH03	OLANZAPINE	0,62	0,62	0,67	0,64	0,98%
N05AH04	QUETIAPINE	1,30	1,25	1,23	1,26	-1,00%
N05AX08	RISPERIDON	2,17	2,05	2,02	2,08	-1,46%
N06AA09	AMITRIPTYLINE	0,22	0,22	0,22	0,24	2,51%
N06AA10	NORTRIPTYLINE	0,34	0,35	0,35	0,36	1,65%
N06AA16	DOSULEPINE	0,53	0,53	0,53	0,55	1,64%
N06AB03	FLUOXETINE	0,15	0,15	0,15	0,15	-0,15%
N06AB04	CITALOPRAM	0,24	0,23	0,22	0,22	-3,11%
N06AB05	PAROXETINE	0,23	0,22	0,22	0,22	-0,72%
N06AB10	ESCITALOPRAM	0,15	0,15	0,15	0,15	-1,20%
N06AX05	TRAZODON	0,28	0,28	0,28	0,29	1,23%
N06AX11	MIRTAZAPINE	0,37	0,36	0,35	0,36	-1,39%
R03AL01	FENOTEROL MET IPRATROPIUMBROMIDE	0,34	0,33	0,33	0,34	0,23%
R03AL02	SALBUTAMOL MET IPRATROPIUMBROMIDE	0,71	0,82	0,84	0,86	6,83%
R03BB01	IPRATROPIUM BROMIDE	0,24	0,27	0,32	0,37	16,23%
R03DA04	THEOFYLLINE	0,16	0,16	0,16	0,17	1,64%
R06AE07	CETIRIZINE	0,07	0,07	0,06	0,07	-0,49%
R06AE09	LEVOCETIRIZINE	0,07	0,07	0,07	0,08	0,98%

Evolutie van de uitgaven per ATC-code en per DDD in euro

(Voor de leesbaarheid is de lijst beperkt tot de 23 meest gebruikte ATC-codes in 2023)

D. Uitgaven ten laste van de verzekerde gebruiker (aandeel van de patiënt)

	TOTAAL
<i>Jaarlijks verbruik (DDD)</i>	135.281.540
Jaarlijkse uitgaven	42.872.285€
Totaal aandeel patiënten	11.299.020€
Gemiddeld jaarlijks aandeel per verzekerde gebruiker¹	26,25€
% ten laste van de verzekerde gebruiker²	20,86%

¹ De gemiddelde financiële bijdrage per jaar per verzekerde gebruiker die het geneesmiddel gebruikt, wordt berekend door het totaal aandeel patiënten te delen door het aantal verzekerde gebruikers dat het geneesmiddel gebruikt.

² Dit is het aandeel van de verzekerde gebruiker (aandeel van de patiënt) in de kosten van de in het kader van de verzekering verstrekte geneesmiddelen (d.w.z. exclusief de verkoop buiten de ziekteverzekering om).

4. SAMENVATTING VAN DE BELANGRIJKSTE GEGEVENS

Belangrijkste voorschrijvers:	Huisartsen	85%
CONTEXT		
Percentage van de verkoop dat niet door de ziekteverzekering wordt gedekt (RIZIV) ¹		37,4%
PROFIEL VAN DE VERZEKERDE VERBRUIKERS		
Percentage verzekerde verbruikers		17,77%
Mediane leeftijd		75 j.
Max./Min. ratio ² van de mediane leeftijd (per arrondissement*)		1,04
Percentage vrouwen		65,5%
Ratio Voorkeurregeling/Algemene regeling		1,54
Variatiecoëfficiënt (2023)		11,8%
Max./Min. Ratio ² van het percentage verzekerde verbruikers (per arrondissement*)		1,52
VERBRUIK		
Jaarlijks verbruik (DDD)		135.281.540
Verbruik van DDD (per 100.000 verzekerden)		5.585.025
Gemiddeld jaarlijks verbruik per verzekerde verbruiker (in DDD)		314
Percentage verzekerde verbruikers met meer dan 3 keer de gemiddelde consumptie		2,87%
Variatiecoëfficiënt ³ (2020-2022)	13,02%	NS
Variatiecoëfficiënt ³ (2021-2023)	13,06%	
Trend ⁴ (2020-2023)	-0,09%	NS
Trend ⁵ (2020-2021)	0,31%	NA
Trend ⁵ (2021-2023)	-0,28%	
DIRECTE UITGAVEN (op basis van DDD)		
Jaarlijkse uitgaven ten laste van de ziekteverzekering		42.872.285€
Gemiddelde jaarlijkse uitgaven per verzekerde		17,7€
Gemiddeld aandeel patiënt per verzekerde verbruiker		20,9%
Max./Min. Ratio ² van de uitgaven per verzekerde (per arrondissement*)		1,49
% Goedkope geneesmiddelen		86,1%
Trend (2020-2023)		-0,84%
Trend (2021-2023)		-0,14%

¹ Benaderende waarde geschat uit de discrepantie tussen de in DDD omgezette verkoopdeclaraties van groothandelaren aan apotheken en wat door de ziekteverzekering en het eigen aandeel van de patiënt wordt betaald (zie bijlage D). Dit is een contextuele indicator.

² Een resultaat "NA" wordt vermeld bij een niet berekenbare ratio, d.w.z. als de minimumwaarde gelijk is aan nul.

³ De test vergelijkt de variatiecoëfficiënten voor de twee periodes en geeft aan of het verschil statistisch significant is.

⁴ De test geeft aan of het groeipercentage statistisch verschilt van 0%.

⁵ De test geeft aan of de trendbreuk tussen de twee periodes statistisch significant is.

5. BIJLAGEN

A. Variantieanalyse (ANOVA), behalve Brussel (op basis van de verzekerde verbruikers)

Statistische relevantie van de vastgestelde verschillen in 2023	
<i>Volgens gewest?</i>	***
<i>Volgens geslacht?</i>	***
<i>Volgens terugbetalingsregeling?</i>	***
<i>Volgens geslacht en per gewest?</i>	***
<i>Volgens terugbetalingsregeling en per gewest?</i>	NS
<i>Volgens geslacht en per terugbetalingsregeling?</i>	NS
<i>Volgens geslacht en terugbetalingsregeling en per gewest?</i>	NS


Teneinde de relevantie van de vastgestelde verschillen te kunnen evalueren, werd een lineair mixed ANOVA model gefit op de gegevens van alle arrondissementen* van het Waalse en Vlaamse gewest, na standaardiseren volgens leeftijd. Het model bevat de factoren regio, geslacht en terugbetalingsregeling als fixed effecten en ook alle tweewegs interacties en de driewegsinteractie.

Om de analyse correct te interpreteren, moet eerst de driewegs interactie geëvalueerd worden, gevolgd door de tweewegs interacties en daarna door de hoofdeffecten. Als de driewegsinteractie significant is, moet elke interpretatie van het model op dit niveau gebeuren, terwijl de tweewegs interacties en hoofdeffecten dan niet geïnterpreteerd worden. Het Als de driewegsinteractie niet significant is, worden de tweewegsinteracties geëvalueerd. Elk effect dat deel uitmaakt van een significante interactie, moet op het niveau van de interactie worden geïnterpreteerd en niet op het niveau van het hoofdeffect. Enkel wanneer een hoofdeffect geen deel uitmaakt van een significante interactie, kan het rechtstreeks geïnterpreteerd worden.

De **asterisken** tonen de graad van statistische significantie van de testen: * P-waarde $\leq 0,05$ / ** P-waarde $\leq 0,01$ / *** P-waarde $\leq 0,001$ en NS bij een statistisch niet significant resultaat.


B. Percentage goedkope geneesmiddelen

	TOTAAL
<i>Jaarlijks verbruik (DDD)</i>	135.281.540
Percentage goedkope geneesmiddelen	86,1%
Ratio max/min van het % goedkope geneesmiddelen (per arrondissement*)	1,11



De grafiek geeft het percentage DDD van goedkope geneesmiddelen weer ten opzichte van het totaal aantal verstrekte DDD. Naast een balkje per gewest, wordt er een balkje voor de Belgische populatie getoond. Die totale verhouding wordt ook met een stipellijn weergegeven.

Percentage “goedkope” geneesmiddelen dat nationaal en provinciaal wordt verstrekt



■ G ■ R

Verdeling van DDD per klasse "goedkope" geneesmiddelen

% goedkope geneesmiddelen	
G	69,78%
R	30,22%
Gr	0,00%
BIOSIM	0,00%
BIO	0,00%




Het % goedkope geneesmiddelen wordt geëvalueerd per CNK (De CNK-code is een uniek identificatienummer per verpakking dat wordt toegekend aan alle geneesmiddelen en farmaceutische producten (medische hulpmiddelen, voedingssupplementen, cosmetica...) die in de apotheek worden verstrekt).

De status "goedkoop" wordt toegekend op basis van de situatie in augustus van het jaar van dit rapport.

G: geeft de generieke geneesmiddelen weer, Gr = generieke referentiegeneesmiddelen, R: de merkgeneesmiddelen, BIOSIM geeft de biosimilaire geneesmiddelen, BIO, de biologische geneesmiddelen weer.

Geneesmiddelen – Anticholinergica (65 en ouder) (min 80 DDD)




Soort “goedkoop” geneesmiddel (DDD) per provincie

G en Gr: generiek goedkoop (r= referentie) geneesmiddel,
 R: merkgeneesmiddel,
 BIO(SIM) geeft de biosimilaire en biologische geneesmiddelen weer.

C. Variaties in soort verstrekte geneesmiddelen (op basis van DDD)


➔ Variaties in het voorschrift op basis van de ATC-codes:



ATC-Code	Beschrijving
R06AE09	LEVOCETIRIZINE
R06AE07	CETIRIZINE
R03DA04	THEOPHYLLINE
R03BB01	IPRATROPIUM BROMIDE
R03AL02	SALBUTAMOL MET IPRATROPIUMBROMIDE
R03AL01	FENOTEROL MET IPRATROPIUMBROMIDE
N06AX11	MIRTAZAPINE
N06AX05	TRAZODON
N06AB10	ESCITALOPRAM
N06AB05	PAROXETINE
N06AB04	CITALOPRAM
N06AB03	FLUOXETINE
N06AA16	DOSULEPINE
N06AA10	NORTRIPTYLINE
N06AA09	AMITRIPTYLINE
N05AX08	RISPERIDON
N05AH04	QUETIAPINE
N05AH03	OLANZAPINE
N03AF01	CARBAMAZEPINE
N02AX02	TRAMADOL
N02AB03	FENTANYL
N02AA05	OXYCODON
G04BD04	OXYBUTYNINE

Geneesmiddelen – Anticholinergica (65 en ouder) (min 80 DDD)

→ Variaties in het voorschrift per geneesmiddelengroep:



D. Verkoopvolumes buiten de ziekteverzekering om

	2023
<i>Totaal verkoopvolume (in DDD)¹</i>	1.035.212.747
<i>Verkoopvolume binnen de ziekteverzekering (in DDD)</i>	648.116.736
% verkoopvolume buiten de ziekteverzekering om	37,4%

¹ Het totale verkoopvolume omgezet naar DDD is gebaseerd op de database "LMPB" van IQVIA en is omgezet naar DDD volgens de WHO-referenties. Volumes zijn opgeteld op ATC 5-niveau en houden geen rekening met mogelijke selectiecriteria (leeftijd, geslacht of andere) die van toepassing zijn op de analyse.

Geneesmiddelen – Anticholinergica (65 en ouder) (min 80 DDD)

ATC-Code	Beschrijving	Totaal volume	Volume terugbetaald	% niet terugbetaald*
A02BA	H2-RECEPTORBLOKKERENDE MIDDELEN	240	0	100,00%
A03FA	PROPULSIVA	14.127.636,49	179.627,51	98,73%
A07DA	ANTIPROPULSIVA	9.086.866,50	727.552,40	91,99%
G04BD	MIDDELEN MET INVLOED OP DE MICTIEFREQUENTIE EN BIJ URINE-INCONTINENTIE	36.374.783,41	9.411.998,33	74,12%
G04BE	FARMACA BIJ ERECTIESTOORNISSEN	17.880.796,25	0	100,00%
M03BX	OVERIGE CENTRAAL WERKENDE MIDDELEN	4.641.999,22	4.641.999,22	0,00%
N02AA	NATUURLIJKE OPIUMALKALOÏDEN	5.734.426,58	4.424.986,92	22,83%
N02AB	FENYLPIPERIDINERIVATEN	9.711.371,20	9.697.457,70	0,14%
N02AX	OVERIGE OPIOÏDEN	33.131.614,08	29.404.354,11	11,25%
N03AE	BENZODIAZEPINERIVATEN	3.140.085,00	0	100,00%
N03AF	CARBOXAMIDEDERIVATEN	5.110.865,00	4.747.682,60	7,11%
N04AA	TERTIAIRE AMINEN	1.469.436,00	1.454.272,40	1,03%
N04BB	ADAMANTAANDERIVATEN	20.840,00	20.650,50	0,91%
N05AA	FENOTHIAZINEN MET ALIFATISCHE ZIJKETEN	442.128,86	392.709,83	11,18%
N05AD	BUTYROFENONDERIVATEN	2.879.571,64	2.705.573,21	6,04%
N05AH	DIAZEPINEN, OXAZEPINEN, THIAZEPINEN EN OXEPINEN	26.163.289,19	26.163.289,19	0,00%
N05AX	OVERIGE ANTIPSYCHOTICA (NEUROLEPTICA)	22.081.607,92	21.486.964,40	2,69%
N05BA	BENZODIAZEPINERIVATEN	163.919.245,24	0	100,00%
N05BB	DIFENYLMETHAANDERIVATEN	1.791.085,82	0	100,00%
N05CD	BENZODIAZEPINERIVATEN	103.640.081,14	0	100,00%
N06AA	NIET-SELECTIEVE MONOAMINE-HEROPNAMEREMMERS	13.840.970,86	13.744.249,50	0,70%
N06AB	SELECTIEVE SEROTONINE-HEROPNAMEREMMERS	233.155.939,00	231.814.335,00	0,58%
N06AX	OVERIGE ANTIDEPRESSIVA	140.569.107,88	139.458.187,58	0,79%
R03AL	SYMPATHOMIMETICA MET ANTICHOLINERGICA	66.188.864,09	64.695.359,12	2,26%
R03BB	PARASYMPATHICOLYTICA	19.668.782,18	19.101.263,44	2,89%
R03DA	XANTHINERIVATEN	1.990.365,00	1.990.365,00	0,00%
R05DA	OPIUMALKALOÏDEN EN DERIVATEN	9.666.191,71	0	100,00%
R06AA	AMINOALKYLETERS	2.856.763,00	0	100,00%
R06AD	FENOTHIAZINERIVATEN	360	0	100,00%
R06AE	PIPERAZINERIVATEN	85.927.434,00	61.853.858,00	28,02%
TOTAL		1.035.212.747,26	648.116.735,97	37,39%

Aandeel verkocht buiten ziekteverzekering om per ATC-groep (2023)

*% niet terugbetaald: schatting van het percentage van de verkoop dat niet door de ziekteverzekering wordt gedekt (RIZIV)

Geneesmiddelen – Anticholinergica (65 en ouder) (min 80 DDD)

Volumes zijn opgeteld op ATC 5-niveau en houden geen rekening met mogelijke selectiecriteria (leeftijd, geslacht of andere) die van toepassing zijn op de analyse.